

- Pubescenza come sopra. Squama obliqua. Antenne e zampe lunghe. Algeria occidentale 14. *erigens* For.
Colorazione ed occhi come sopra. Statura varia; nelle piccole forme le guance non sono mai pelose. Lamine frontali lunghe, non distanti, poco divergenti. Bacino mediterraneo (fig. I, 10). 15. *sylvaticus* A.
Colorazione ed occhi come sopra. Statura relativamente piccola (lunghezza delle tibie posteriori al massimo 2,8 mm.). Lamine frontali distanti (fig. I, 16, 17). Guance pelose. Asia centrale, Anatolia, Europa meridionale 16. *aethiops* Latr.
5. Specie del Bacino Mediterraneo, dell'Asia centrale, della Regione orientale, dell'Australia e dell'Oceania. Tibie non provviste di aculei al margine flessorio.
Squama coronata sul margine di una raggiera di setole di tre paia, eccezionalmente meno.
Lamine frontali distinte e divergenti. Pubescenza degli arti obliquamente eretta. Colore chiaro. Asia centrale. 17. *fedtschenkoi* Mayr.
Lamine frontali più lunghe e poco divergenti (fig. I, 12, 13). Lobo del clipeo mediocrement sporgente, generalmente troncato. India, Malesia, Australia, Oceania. 18. *variegatus* F. Sm.
Lamine frontali come sopra. Lobo del clipeo brevissimo e lievemente intaccato nel mezzo. Tutto nero, opaco o subopaco anche il gastro. Capo della ♀ massima grandissimo. Malesia. 19. *odiosus* For.
Lamine frontali e clipeo come nella specie precedente. Capo rosso nelle ♀ maggiori, grandissimo nelle massime; gastro lucidissimo. Malesia 20. *maxvellensis* For.
Lamine frontali relativamente brevi e divergenti (fig. I, 14, 15). Lobo del clipeo breve ed al solito