

var. **erythraea** n.

C. maculatus var. *lohieri* Emery « Boll. Lab. Zool. Portici », vol. 10, p. 24 (1915) nec Santscki.

Operaia massima. — Colorazione pressochè simile alla var. precedente, ma le macchie gialle sul gastro sono meno estese e tutto il dorso del torace è nero. Il capo è assolutamente opaco con 3 fossette, che rappresentano ocelli rudimentali. Corpo massiccio. — L. 15 mm.; capo $4 \times 3,8$; torace 4,5, scapo 3; tibia post. 3,6.

Asmara, Eritrea (SILVESTRI) un solo esemplare.

C. (*Myrmoturba*) *maculatus* F., subsp. *sarmentus* n. (fig. II).

Operaia massima. — Nera; mandibole ferruginee, funicoli, anche a base dei femori fulvo-rossastri. Capo e torace sottilmente punteggiati, quasi opachi, con riflesso quasi velutino; capo sparso nella sua metà anteriore di




Fig. II. — *C. maculatus sarmentus* Emery.
Capo dell'operaia massima e minima.

punti maggiori; gastro e zampe lucidi. Pubescenza nulla sul corpo; sparsa, brevissima e aderente sulle zampe. Pochi peli eretti fulvi sul corpo.

Capo più lungo che largo, poco ristretto in avanti, con margini laterali assai ritondati; margine occipitale pro-