

resto del funicolo bruno; gastro bruno rossiccio. D'altronde simile al tipo della sottospecie.

Maschio. — Convieni con la descrizione del MAYR del ♂ *senex*, ma ha la base dello scapo ed il primo articolo del funicolo rossi.

São Paulo (v. JHERING).

C. (Myrmobrachys) pittieri For., var. *fuscogaster* n.

Operaia massima. — Sembra non differire dal tipo che pel colore della squama e del gastro che più o meno fosco. Nella forma tipica invece è più chiara del resto del corpo.

Vilcanota, Perù; Matto Grosso; un' ♀ per località. Il tipo proviene da Costa Rica.

C. (Myrmobrachys) planatus Rog., var. *acaciae* n.

C. planatus var. Emery, Bull. Soc. Ent. Ital., 22, p. 56 (1890).

Operaia. — Differisce dalla var. *continentis* For. pel colore molto più scuro delle parti rosse; pel colore bruno scuro della parte posteriore del torace, del funicolo (eccetto il 1.º art.) e dei femori che si estende più o meno al resto delle zampe; la squama ed il gastro sono neri.

Costa Rica. Raccolto un tempo dal Sig. ALFARO sulle Acacie, di cui occupa le spine abbandonate dalle Pseudomirme.

C. (Myrmobrachys) mus Rog., subsp. *mustela* n.

Operaia e femmina. — Differisce dal tipo, nell' ♀, pel torace meno largo, con le spalle del pronoto arrotondate (nel tipo sono quasi angolose). La pubescenza del gastro è ancora più fitta, fulvo-dorata, anche nella ♀.

Bolivia (St. e B.-H.).