

GROUPE DE *PH. FLAVENS*, ROGER

Caractères. — ♂ et ♀ : Massue à article terminal plus long et plus gros (souvent du double plus long et beaucoup plus gros) que le précédent. Petites et très petites espèces. Tête du ♂ pas beaucoup plus longue que large, en général à sculpture serrée, couvrant toute la tête, ou ne laissant libre que la moitié postérieure; ♀ en général trapues, à tête et corselet mats.

327. *Ph. anastasii*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 28, p. 76 (1896) ♂ ♀.
Ph. anastasii Forel, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg, Vol. 18, p. 78 (1901) ♀.
var. *cellarum*, Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. Vol. 44, p. 55 (1908) ♂ ♀.
Ph. anastasii var. *cellarum*, Forel, Fauna Ins. Helvetic. Hym. Form. p. 33, 34 (1915) ♀ ♀.
var. *johsoni*, Wheeler, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 23, p. 272 (1907) ♂ ♀.
var. *sospes*, Forel, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 58, p. 381 (1908) ♂ ♀.
var. *venezuelana*, Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 49, p. 159 (1905) ♂ ♂.
328. *Ph. arhuaca*, Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 45, p. 364 (1901) ♂ ♀ ♀.
subsp. *bimons*, Forel, ibidem, Vol. 19, p. 234 (1912) ♂ ♀.
329. *Ph. bambusarum*, Forel, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 58, p. 376 (1908)
♂ ♀ ♀.
330. *Ph. cataractae*, Wheeler, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 35, p. 6 (1916) ♂ ♀.
331. *Ph. chalca*, Wheeler, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 22, p. 44 (1914) ♂ ♀ ♀.
332. *Ph. christopherseni*, Forel, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 19, p. 229 (1912) ♂ ♀.
333. *Ph. constipata*, Wheeler, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 24, p. 468 (1908)
♂ ♀ ♀ ♂.
334. *Ph. dimidiata*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 26, p. 160 (1894) ♂ ♀.
subsp. *nitidicollis*, Emery, ibidem, Vol. 28, p. 79 (1896) ♂ ♀.
subsp. *schmalzi*, Emery, ibidem, Vol. 26, p. 161 (1894) ♂ ♀.
335. *Ph. flavens*, Roger, Berlin, Ent. Zeitschr. Vol. 7, p. 198 (1863) ♂ ♀.
Ph. flavens, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 20, p. 981, 983 (1870);
ibidem, Vol. 37, p. 591, 603 (1887) ♂ ♀; Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 26, p. 155 (1894).
var. *breviscapa*, Forel, Biol. Centr.-Amer. Hym. Vol. 3, p. 77 (1899) ♂.
var. *farquaharensis*, Forel, Trans. Linn. Soc. London, Vol. 12, p. 91 (1907) ♀.
var. *haytiana*, Forel, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg, Vol. 24, p. 6 (1907) ♀.
Ph. flavens var. *haytiana*, Wheeler, Bull. Amer. Mus. Vol. 33, p. 24 (1914) ♂ ♀ ♂.
var. *thomensis*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 26, p. 156 (1894) ♂ ♀ ♀.
var. *vincentensis*, Forel, Trans. Soc. Ent. London, p. 411 (1893) ♂ ♀ ♀ ♂.
subsp. *asperithorax*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 26, p. 160 (1894) ♂ ♀ ♀
(minutula var.).
Ph. flavens subsp. *asperithorax*, Emery, ibidem, Vol. 28, p. 78 (1896); Forel,
Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 58, p. 380 (1908).
var. *nugax*, Forel, ibidem, Vol. 58, p. 380 (1908) ♂ ♀.
var. *rehi*, Forel, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. Vol. 10, p. 285 (1900) ♂ ♀ ♀ (*Ph. rehi*).
Ph. flavens st. *asperithorax* var. *rehi*, Forel, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien,
Vol. 58, p. 380 (1908).
var. *semipolita*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 28, p. 78 (1896) ♂ ♀.
subsp. *gracilior*, Forel, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg, Vol. 18, p. 78 (1901) ♂ ♀ ♀.
subsp. *exigua*, Mayr, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 18, p. 36 (1884) ♂.
Ph. exigua, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 37, p. 585 (1887) ♂.
Ph. flavens subsp. *exigua*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 26, p. 156 (1894) ♂;
Wheeler, Bull. Ann. Mus. Vol. 24, p. 134 (1908) ♂ ♀ ♀.
subsp. *navigans*, Forel, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg, Vol. 18, p. 79 (1901) ♂ ♀.
subsp. *rudigenis*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 37, p. 155 (1905) ♂.
subsp. *sculptior*, Forel, Trans. Ent. Soc. London, p. 414 (1893) ♂ ♀ ♀.
var. *grenadensis*, Forel, ibidem, p. 300 (1897) ♂.
subsp. *tuberculata*, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 37, p. 585 (1887) ♂
(exigua var.).
Ph. flavens subsp. *tuberculata*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 26, p. 157 (1894).
var. *jheringi*, Emery, ibidem, Vol. 24, p. 157 (1894) ♂ ♀.
Ph. exigua var. *tuberculata*, Emery, ibidem, Vol. 19, p. 354 (1887) nec Mayr.
var. *putata*, Forel, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 19, p. 235 (1912) ♂.
var. *platensis*, Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. Vol. 50, p. 273 (1914) ♂ ♀ ♂.
- Costa-Rica.
Costa Rica: Serres, à Londres,
[en Allemagne, etc.
Honduras.
Brésil : S. Paulo.
Vénézuéla.
Colombie.
Brésil : Ceará.
Brésil : S. Paulo.
Guyane anglaise.
Mexique : Hidalgo.
Panama.
Texas.
Bolivie.
Costa-Rica.
Brésil : Santa Catharina.
Cuba.
Guatémala.
Île Farquhar (importé?)
Haïti.
Île St-Thomas, Haïti.
Île St-Vincent.
Bolivie.
Brésil : S. Paulo.
Vénézuéla.
Brésil : Pará, S. Paulo.
Indes occidentales.
Guyane, Porto Rico.
Mexique.
Rép. Argentine.
Îles S. Vincent, Martinique,
Île Grenada. [Porto Rico.
Brésil méridional, Paraguay.
Brésil méridional, Paraguay,
Buenos-Aires.
Brésil : S. Paulo.
Buenos-Aires.