

354. *Ph. terresi*, Wheeler & Mann, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 33, p. 22 Haïti.  
 (1914) ♂ ♀ ♀.  
 var. *illota*, Wheeler & Mann, ibidem, Vol. 33, p. 23 (1914) ♂ ♀.  
 Haïti.
355. *Ph. tetrica*, Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. Vol. 49, p. 226 (1913) ♂ ♀ ♀.  
 Brésil : S.-Catharina.
356. *Ph. transversostriata*, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 37, p. 584 Guyane.  
 (1887) ♂.  
 var. *nigridens*, Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 45, p. 362 (1901) ♂ ♀.  
 Colombie.

## ESPÈCES D'AMÉRIQUE

qui ne me sont pas suffisamment connues pour être classées dans les groupes précédents.

357. *Ph. bilimeki*, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 20, p. 980, 985 Mexique.  
 (1870) ♂ ♀.
358. *Ph. castanea*, Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus. Vol. 6, p. 131 (1858) ♀ Brésil.  
*(Myrmica [Monomarium]).*  
*Aphaenogaster castanea*, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 36, p. 359 (1886).  
*Ph. castanea*, Emery, Rend. Accad. Sc. Bologna, p. 69 (1914-15).
359. *Ph. cephalica*, Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus. Vol. 6, p. 177, pl. 9, Brésil.  
 f. 21-23 (1858) ♂ ♀.  
*Ph. cephalica*, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 36, p. 361 (1886).
360. *Ph. cubaensis*, Mayr, ibidem, Vol. 12, p. 747 (1862) ♂ ♀.  
*Ph. cubaensis*, Mayr, ibidem, Vol. 20, p. 980, 983 (1870); ibidem, Vol. 37, p. 584, 601 (1887) ♂ ♀.
361. *Ph. diligens*, Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus. Vol. 6, p. 168 (1858) Brésil.  
 ♂ ♀ (*Atta*).  
*Ph. diligens*, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 36, p. 360 (1886).
362. *Ph. laeviventris*, Mayr, Sitz. ber. Akad. Wiss. Wien, Vol. 61, p. 491 (1870). Colombie.  
*Ph. laeviventris*, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 20, p. 983 (1870); ibidem, Vol. 37, p. 601 (1887) ♂ ♀.  
*Ph. leviventris*, Dalla Torre, Cat. Hym. Vol. 7, p. 92 (1893).
363. *Ph. longipes* (Latireille), Fourmis, p. 233, pl. 11, fig. 68 (1802) ♀ (*Formica*). Cayenne.  
*Ph. longipes*, Emery, Psyche, Vol. 28, p. 25 (1921).
364. *Ph. nigritiventris*, Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus. Vol. 6, p. 169 Brésil : Rio-Janeiro.  
 (1858) ♀ (*Atta*).  
*Ph. nigritiventris*, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 36, p. 360 (1886).
365. *Ph. partila*, Mayr, ibidem, Vol. 37, p. 590, 604 (1887) ♂ ♀.  
 Brésil.
366. *Ph. pennsylvanica* (Buckley), Proc. Ent. Soc. Philadelphia, Vol. 6, Philadelphie.  
 p. 345 (1867) ♂ ♀ (*Atta*), nec Roger.  
*Aphaenogaster pennsylvanica*, Cresson, Synops. Hym. Am. p. 259 (1887).  
*Ph. pennsylvanica*, Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 338 (1895); Wheeler, Trans. Texas Acad. Sc. Vol. 4, part. 2, p. 29 (1902).
367. *Ph. picea* (Buckley), Proc. Ent. Soc. Philadelphia, Vol. 6, p. 344 (1867) Texas.  
 ♂ (*Atta*).  
*Aphaenogaster picea*, Cresson, Synops. Hym. Am. p. 259 (1887).  
*Ph. picea*, Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 338 (1895); Wheeler, Trans. Texas Acad. Sc. Vol. 4, part. 2, p. 28 (1902).
368. *Ph. piceonigra n. nom.* Mexique.  
*Ph. picea*, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 20, p. 981, 983 (1870); Vol. 37, p. 588, 601 (1887) ♂ ♀, nec Buckley.
369. *Ph. piliventris* (Fred. Smith), Cat. Hym. Brit. Mus. Vol. 6, p. 169 Brésil : Tejuca.  
 (1858) ♀ (*Atta*).  
*Ph. piliventris*, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 36, p. 360 (1886).
370. *Ph. punicensis* (Roger), Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 7, p. 189 (1863) (*Macromischa*). Cuba.  
*Aphaenogaster punicensis*, Emery, Bull. Soc. Ent. France, Vol. 65, p. 103 (1896).  
*Macromischa punicensis*, Wheeler, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 24, p. 141 (1908) ♀; Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, Vol. 54, p. 488 (1913).  
*Ph. punicensis*, Emery, Rend. Accad. Sc. Bologna, p. 67 (1914-15).