

3. Enfin les espèces de l'Amérique australe, *Ph. aberrans*, Mayr, et formes voisines. Je limite le s. g. *Elasmopheidole* à ce groupe ; peut-être faudra-t-il lui ajouter l'espèce mexicaine, *Ph. tisiphone*, Wheeler, que je ne connais que par la description.

**Type.** — *Pheidole aberrans*, Mayr, d'après une lettre de M. Forel.

**Distribution géographique des espèces.** — Bassin de La Plata (Paraguay, République Argentine, Uruguay, Rio Grande do Sul).

379. *Ph. aberrans*, Mayr, Annuar. Soc. Natural. Modena, Vol. 3, p. 172 (1868) Rép. Argentine, Brésil S. ♂ ♀ (Pl. 2, Fig. 9).

*Ph. aberrans*, Mayr. Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 20, p. 981, 984 (1870) ;  
ibidem, Vol. 37, p. 583, 602 (1887) ♂ ♀ ; Emery. Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 37, p. 141, fig. 19, a, c. (1905) ♂ ♀ ; Bruch, Rev. Mus. La Plata, Vol. 23, p. 311, fig. 2 c, g, 6 (1916) ♂ ♀ ♂ ♀ ♂.

*Ph. (Elasmopheidole) aberrans*, Forel, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 36, p. 43 (1913) ;  
Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. Vol. 49, p. 232 (1913) ♂.

var. *fartilia*, Forel, ibidem, Vol. 49, p. 233 (1913) ♂.

var. *mutica*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 37, p. 142, fig. 19 b (1905) ♂.

380. *Ph. arciruga*, Forel, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 58, p. 381 (1908) ♀.  
subsp. *obnixa*, Forel, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 19, p. 236 (1912) ♀.

*Ph. arciruga r. obnixa*, Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. Vol. 49, p. 231 (1913) ♂ ♀.

381. *Ph. cavifrons*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 37, p. 144, fig. 21 (1905) ♂ ♀.

var. *fuscipunctis*, Santschi, Physis, Buenos-Aires, Vol. 2, p. 374, fig. (1916) ♂ ♀ ♀.

Argentine : Jujuy.

Patagonie.

382. *Ph. laticrista*, Santschi, ibidem, Vol. 2, p. 375, 2 fig. (1916) ♂ ♀ ♀.

Brésil : Rio Grande do S.

383. *Ph. taurus*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 37, p. 142, fig. 20 a, b, c. (1905) ♂ ♀ ♀ (Pl. 2, Fig. 2).

Buenos-Aires, Rosario.

*Ph. (Elasmopheidole) taurus*, Forel, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 36, p. 43 (1913).

### ESPÈCE DOUTEUSE

384. *Ph. tisiphone*, Wheeler, Psyche, Vol. 18, p. 203 (1911) ♂. Mexique.

### 7. SUBGENUS TRACHYPHEIDOLO, EMERY

**Pheidole**, subgenus **Trachypheidole**. Emery, Bull. Soc. Ent. France, p. 190 (1915).

**Caractères.** — *Soldat*. — Tête allongée, à côtés parallèles, couverte d'une sculpture rude, vermiculée.

Arêtes frontales assez courtes, ne formant pas de scrobe.

Antennes courtes et épaisses; scape très épais, courbé à la base; massue comme dans le groupe *subarmata* du s. g. *Pheidole*.

**Type.** — *Pheidole bicornis*, Forel.

**Distribution géographique des espèces.** — Colombie, Brésil.

385. *Ph. aper*, Forel, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 19, p. 227 (1912) ♂ ♀ ♀. Brésil : Rio-Janeiro.

386. *Ph. bicornis*, Forel, Biol. Centr.-Amer. Hym. Vol. 3, p. 74, pl. 3, f. 24 (1899) ♂. Panama.

387. *Ph. distorta*, Forel, ibidem, Vol. 3, p. 74, nota (1899) ♂ ♀. Colombia.

subsp. *reclusi*, Forel, ibidem, Vol. 3, p. 75 nota (1899) ♂ ♀. Colombia.

*Ph. distorta st. reclusi*, Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 45, p. 356 (1901);  
Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 19, p. 230 (1912) ♀.