

## 8. SURGENUS SCROBOPHEIDOLOE, EMERY

**Pheidole**, subgenus **Scrobopheidole**. Emery, Bull. Soc. Ent. France, p. 190 (1915).

**Caractères.** — *Soldat et femelle*. — Tête courte, couverte d'une sculpture serrée mais fine. Arêtes frontales longues, à peu près droites, divergentes (comme dans le s. g. *Elasmopheidole*), recouvrant chacune une scrobe pour le scape (Pl. 2, Fig. 6); massue comme dans le groupe *flavens* du s. g. *Pheidole*, article terminal remarquablement gros.

*Ouvrière*. — Caractères du groupe *flavens* du s. g. *Pheidole*.

*Male*. — Ocelles portés sur une protubérance très marquée du vertex.

Cellule radicale fermée.

**Distribution géographique des espèces.** — Amérique centrale, Brésil.

388. *Ph. colobopsis*, Mann, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, Vol. 60, p. 439, Brésil: Madeira-Mamoré. pl. 3, f. 25, 26 (1916) ♀.

389. *Ph. scrobifera*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 28, p. 73, pl. 1, f. 14 Costa-Rica. (1896) ♂ ♀ ♂. (Pl. 2, Fig. 6).

## 9. SUBGENUS DECAPHEIDOLOE, FOREL

**Decapheidole**, Forel, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 19, p. 237 (1912).

**Caractères.** — *Soldat, ouvrière et femelle*. — Espèces minimes qui ressemblent en tout point à *Ph. flavens*, Rog. et formes voisines, mais qui ont les antennes de 10 articles.

*Male* inconnu.

**Type.** — *Pheidole perpusilla*, Emery.

**Distribution géographique des espèces.** — Pará, Ile Trinidad.

390. *Ph. decem*, Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 45, p. 366 (1901) ♂. Ile Trinidad.

*Ph. (Decapheidole) decem*, Forel, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 19, p. 237 (1912).

391. *Ph. perpusilla*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 26, p. 157 (1894) ♂ ♀ ♂ Brésil : Pará. (*flavens* subsp.)

*Ph. perpusilla*, Emery, ibidem, Vol. 28, p. 80 (1896).

*Ph. (Decapheidole) perpusilla*, Forel, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 19, p. 237 (1912).

## 9. GENUS CERATOPHEIDOLOE, PERGANDE

**Pheidole**, subgenus **Ceratopheidole**. Pergande, Proc. Calif. Acad. Sc. (2), Vol. 5, p. 889 (1895); Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 10, p. 165 (1902).

**Ceratopheidole**. Emery, Rend. Accad. Sc. Bologna, p. 40 (1913-14).

**Phidole** (part.). Bingham, Fauna Brit. India, Hym. Vol. 2, p. 227 (1903).

**Caractères.** — *Soldat, ouvrière et femelle*: — Neutres dimorphes : chez *C. smythiesi*, For. il y a passage graduel entre les soldats et les ouvrières, tandis que chez *C. hecate*, Wheel. il n'y en a pas.

Semblables aux formes correspondantes de *Pheidole* : en diffèrent par la massue des antennes qui est de 4 articles.