

Male. — D'après Forel, le mâle de *C. smythiesi* est semblable au mâle de *Pheidole*: il a la tête arrondie en arrière et les mandibules à 4 dents.

Type. — *Ceratopheidole granulata*, Perg.

Distribution géographique des espèces. — Mexique, Antilles; Inde, Sumatra, Java.

ESPÈCES AMÉRICAINES

1. *C. granulata*, Pergande, Proc. Calif. Acad. Sc. (2), Vol. 5, p. 890 (1895) ♂. Mexique.
2. *C. hecate*, Wheeler, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 30, p. 26 (1911) ♂ ♀. Jamaïque.
subsp. *bruesi*, Wheeler, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, Vol. 61, p. 460 (1917) ♂ ♀. Jamaïque.
subsp. *malevola*, Wheeler, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 30, p. 27 (1911) ♀ ♂. Jamaïque.

ESPÈCES DE L'INDE

3. *C. bhavanae*, Bingham, Fauna Brit. India, Hym. Vol. 2, p. 227, 228 Sikhim 2500 m. (1903) ♂ ♀ (*Phidole*).
4. *C. bluntschlii*, Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. Vol. 47, p. 373 (1911) ♀. Sumatra.
5. *C. emmae*, Forel, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg, Vol. 22, p. 20 (1905) ♀. Java.
6. *C. smythiesi*, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 10, p. 165, 185 (1902) ♂ ♀ ♀ ♂. Assam, Java. (*smythiesii*).
C. smythiesii, Forel, Journ. Bombay, Nat. Hist. Soc. Vol. 14, p. 523, 538 (1902) ♂ ♀ ♀ ♂.
Phidole smythiesi, Bingham, Fauna Brit. India, Hym. Vol. 2, p. 227, fig. 79 (1903) ♂ ♀ ♀ ♂.
var. *bengalensis*, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 10, p. 186 (1902) ♀. Bengale.

10. GENUS ISCHNOMYRMEX, MAYR

Ischnomyrmex. Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 12, p. 738 (1862); Emery, Rend. Accad. Sc. Bologna, p. 40 (1913-14).

Pheidole, subgenus **Ischnomyrmex**. Forel, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 36, p. 49 (1913).

Pheidole, subgenus **Isopheidole**. Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 20, p. 765 (1913).

Aphaenogaster (part.). Emery, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 25, p. 531 (1888).

Myrmica (part.). Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus. Vol. 6, p. 126 (1858).

Caractères. — *Soldat, ouvrière et femelle.* — Neutres dimorphes, pas de passages entre le soldat et l'ouvrière.

Antennes grêles, en apparence dépourvues de massue, grossissant un peu vers l'extrémité; mais les cinq derniers articles sont distinctement plus longs que les précédents et ont une pubescence différente; ils représentent une massue de 5 articles.

Chez l'ouvrière, la tête est prolongée en un col marqué, comme du reste chez quelques *Pheidole*.

Gastre non tronqué à la base.

Male. — Semblable aux mâles du s. g. *Pheidole*: vertex semblablement prolongé en arrière.

Corselet plus étroit que chez *Pheidole*, sans sillons de Mayr.

Type. — *Myrmica longipes*, F. Sm.