

Distribution géographique de l'espèce. — Indochine, Iles de la Sonde.

1. *I. longipes* (Fred. Smith), Journ. Proc. Linn. Soc. Lond. Zool. Vol. 2, p. 70, Bornéo, Java, Indochine.
 pl. 1, f. 6 (1857) ♀ (*Myrmica*).
Myrmica longipes, Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus. Vol. 6, p. 126 (1858) ♀.
I. longipes, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 12, p. 739 (1862); Tijdschr.
 v. Ent. Vol. 10, p. 92 (1867) ♀.
Aphaenogaster longipes, Emery, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 25, p. 531,
 pl. 9, f. 2 (1888); Bingham, Fauna Brit. India, Hym. Vol. 2, p. 270, 272
 (1903) ♀.
 var. *conicollis*, Emery, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 40, p. 681, fig. (1901) ♀. Sumatra, Malacca.
Pheidole (Isopheidole) longipes var. *conicollis*, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 20,
 p. 766 (1913).
Pheidole (Ischnom.) longipes var. *conicollis*, Forel, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 36,
 p. 50, fig. N-R (1913) ♂ ♀ ♀.
 var. *continentis*, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 19, p. 24 (1911) ♀. Birmanie, Singapore.
Pheidole (Ischnom.) longipes, var. *continentis*, Viehmeyer, Zool. Jahrb. Syst.
 Vol. 37, p. 608 (1914) ♂.
 subsp. *pseudola*, Forel, Tijdschr. v. Ent. Vol. 58, p. 28 (1915) ♂ ♀ ♂ (*Pheidole* subg. *I.*). Simalur.

III. GENUS EPIPHEIDOLE, WHEELER

Epipheidole. Wheeler, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 20, p. 14 (1904).

Pheidole (part.). Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 290 (1895).

Caractères. — Pas de soldat ni d'ouvrière.

Femelle. — Ailée; ailes comme *Pheidole*.

Tête aussi large que longue, carrée, le bord postérieur échancré; yeux et ocelles développés.

Arêtes frontales se prolongeant jusque vers la moitié de la longueur de la tête.

Mandibules comme chez *Pheidole*.

Antennes de 12 articles, plutôt épaisses; scape dépassant un peu le bord occipital; 1^{er} article du funicule gros et long; massue de 3 articles, l'article terminal presque aussi long que les deux précédents ensemble; l'article qui vient avant la massue distinctement plus grand que le précédent.

Corselet aussi large que la tête; pronotum à angles prononcés; mésonotum déprimé; épines épinotoales massives et obtuses.

Pétiole surmonté d'un nœud squamiforme; postpétiole pas large; gastre tronqué à la base.

Poils de la tête et du corselet obtus et microscopiquement frangés.

Male. — Très semblable à *Pheidole*; à peu près de la même grandeur que la femelle.

Vertex protubérant.

Mandibules à 2 ou 3 dents.

Corselet sans sillons de Mayr.

Ethologie. — Parasite d'une *Pheidole* (*Ph. pilifera*, Rog. var. *coloradensis*, Emery).

Distribution géographique de l'unique espèce. — Colorado.

1. *E. inquilina*, Wheeler, Bull. Amer. Mus. Vol. 20, p. 15, pl. 2, f. 12-17 Colorado, Nebraska.
 (1904) ♀ ♂.
Pheidole pilifera (part.) Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 290 (1895)
 ♀ anormale.