

8. *M. laevior*, Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 54, p. 445 (1910) ♀. Natal.  
*M. laevior*, Arnold, Ann. S. Afr. Mus. Vol. 14, p. 263, 267 (1916) ♀.
9. *M. natalensis*, Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus. Vol. 6, p. 172 (1858) ♀ (Physatta). Afrique australe et or.
- Heptacondylus eumenoides*, Gerstaecker, Monatsber. Akad. Wiss. Berlin, 1858, p. 263; in Peters, Reise Mossamb. Zool. Vol. 5, p. 514, pl. 32, f. 9 (1862) ♀.  
*M. eumenoides*, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 16, p. 905 (1886) ♀; Stitz, Erg. Deutsch. Zentr. Afr. Exped. Zool. Vol. 3, p. 363, fig. 5 part. (1911) ♀; Santschi, Voy. Alluaud & Jeannel, Afr. or. Hym. p. 116 (1914) table des sous-espèces et var.; Arnold, Ann. S. Afr. Mus. Vol. 14, p. 262, 263, pl. 7, f. 87, 88, 89 (1916) ♀ ♀ ♂.
- M. fodens* st. *eumenoides*, Emery, Rev. Suisse Zool. Vol. 1, p. 219 (1893).  
*Heptacondylus sulcatus*, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 12, p. 756 (1862) ♀.  
var. *fusca*, Stitz, Erg. Deutsch. Zentr. Afr. Exped. Zool. Vol. 3, p. 365 (1911) ♀ (eumenoides var.) Ruwenzori.
- ✓ subsp. *congolensis*, Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 53, p. 59 (1909) ♀ (eumenoides var.). Congo, Guinée.  
*M. eumenoides*, var. *congolensis*, Forel, ibidem, Vol. 54, p. 421 (1910); Vol. 57, p. 354 (1913) ♂.  
*M. eumenoides* st. *congolensis*, Santschi, Voy. Alluaud & Jeannel, Afr. or. Hym. p. 115 (1914).
- M. nitida*, Stitz, Mitt. Zool. Mus. Berlin, Vol. 5, p. 133 (1910) ♀.  
var. *consanguinea*, Santschi, Voy. Alluaud & Jeannel, Afr. or. Hym. p. 115 (1914) ♀ ♀.  
✓ var. *crucheti*, Santschi, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 57, p. 311 (1913) ♀. Benguela, Afrique orientale.  
var. *fumata*, Santschi, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 242 (1916). Côte d'Ivoire.
- M. nitida*, Stitz, var. *brunnea*, Santschi, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 84, p. 254 (1915) (nomen praeocc.).
- subsp. *opaciventris*, Emery, Rev. Suisse Zool. Vol. 1, p. 221, pl. 8, f. 15, 16 (1893) ♀ ♀ ♂ (*M. opaciventris*). Afrique occidentale, Benguela à Gabon.
- M. eumenoides*, st. *opaciventris*, Santschi, Voy. Alluaud & Jeannel, Afr. or. Hym. p. 116 (1914).
10. *M. nigerrima*, Arnold, Ann. S. Afr. Mus. Vol. 14, p. 263, 270, pl. 7, f. 92 (1916) ♀. Rhodésia S.
11. *M. nigra*, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 12, p. 755 (1862) ♀ (Heptacondylus) (Pl. 2, Fig. 18). Cape Colony.
- Heptacondylus niger*, Mayr, Reise Novara, Formicid. p. 110 (1865) ♀.  
*M. nigra*, Emery, in Dalla Torre, Cat. Hym. Brit. Mus. Vol. 7, p. 156 (1893); Arnold, Ann. S. Afr. Mus. Vol. 14, p. 269, pl. 7, f. 91 (1917) ♀ ♂.
12. *M. rugosa*, Fred. Smith, Journ. Proc. Linn. Soc. Lond. Zool. Vol. 6, Nouvelle-Guinée, etc. suppl. p. 110 (1860) ♀ (Heptacondylus).  
*M. rugosa*, Mayr, Tijdschr. v. Ent. Vol. 10, p. 113 (1867).
13. *M. striata*, Stitz, Erg. Deutsch. Zentr. Afr. Exped. Zool. Vol. 3, p. 382, fig. 5, part. (1911) ♀. Afrique orientale, Rhodésia, Natal.  
*M. striata*, Arnold, Ann. S. Afr. Mus. Vol. 14, p. 263, 267, pl. 7, f. 90 (1916) ♀ ♀ ♂.  
*M. striatula*, Santschi, Voy. Alluaud & Jeannel, Afr. or. Hym. p. 116 (1914) (au lieu de *striata*).
- ✓ subsp. *buttgembachi*, Forel, Rev. Zool. Afr. Vol. 2, p. 337 (1913) ♀. Congo belge.
14. *M. tigrensis*, Guérin, in Lefebure, Voy. Abyssinie, Vol. 6, p. 351, pl. 7, f. 7 (1848) ♂ (*Myrmica*). Abyssinie.
- M. tigrensis*, Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus. Vol. 6, p. 141 (1858).
15. *M. vidua*, Fred. Smith, ibidem, Vol. 6, p. 141 (1858) ♂. Java.

## 8. TRIBUS CARDIOCONDYLINI, EMERY

**Cardiocondylini.** Emery, Rend. Accad. Sc. Bologna, p. 36 (1913-14).

**Formicoxenii** (part.). Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 164 (1893).

**Myrmicili** (part.). Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 768 (1895).

**Stenammini** (part.). Ashmead, Canad. Ent. p. 383 (1905).

Voir pour les caractères de la tribu, le genre-type: