

- C. pallidipes*, Dalla Torre, Catal. Hym. Vol. 7, p. 84 (1893); Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 10, p. 412 (1902) ♀.
C. piceus, Lowne, Entomologist, Vol. 2, p. 355 (1865) ♀.
34. *C. queenslandica*, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 10, p. 410 (1902) ♀ ♀ Queensland.
(*sordidula* var.).
- C. sordidula* subsp. *queenslandica*, Forel, ibidem, Vol. 18, p. 32 (1910).
C. queenslandica, Emery, Deutsche Ent. Zeitschr. p. 668 (1912) ♀; Boll. Labor. Zool. Scuola Agric. Portici, Vol. 8, p. 185 (1914).
var. *gilberti*, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 18, p. 32 (1910) ♀ Queensland.
subsp. *froggatti*, Forel, ibidem, Vol. 10, p. 410 (1902) ♀ ♀ (*sordidula* subsp.).
C. froggatti, Emery, Deutsche Ent. Zeitschr. p. 668 (1912) ♀.
var. *scabrida*, Emery, Boll. Labor. Zool. Scuola Agric. Portici, Vol. 8, p. 184 (1914) ♀ Adelaïde.
subsp. *rogans*, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 10, p. 411 (1902) ♀ ♀ (*sordidula* subsp.).
C. rogans, Emery, Deutsche Ent. Zeitschr. p. 668 (1912) ♀. Sydney.
35. *C. rufotestacea*, Mayr, Journ. Mus. Godeffroy, Vol. 12, p. 107, 109 (1876) ♀. Sydney.
C. rufotestacea, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 10, p. 412 (1902) ♀; Emery, Deutsche Ent. Zeitschr. p. 668 (1912) ♀; Boll. Labor. Zool. Scuola Agric. Portici, Vol. 8, p. 184 (1914) ♀ ♀.
36. *C. scita*, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 10, p. 409 (1902) ♀. Queensland.
subsp. *mixta*, Forel, ibidem, Vol. 10, p. 409 (1902) ♀. Queensland.
37. *C. xerophila*, Wheeler, Trans. Royal Soc. S. Austral. Vol. 39, p. 810 (1915) ♀. Australie centrale.
var. *exigua*, Wheeler, ibidem, Vol. 39, p. 811 (1915) ♀. Australie centrale.

ESPÈCES SINGULIÈRES

38. *C. mesonotalis*, Emery, Nova Guinea, Vol. 5, p. 535, fig. 3 (1911) ♀. Nouvelle-Guinée O.
39. *C. ralumensis*, Forel, Mitt. Zool. Mus. Berlin, Vol. 2, p. 16 (1901) ♀. Archipel Bismarck.

GROUPE DE *C. PARADOXA*, EMERY (1)

40. *C. emeryi*, Forel, Ann. Mus. Nat. Hung. Vol. 5, p. 25 (1907). Nouvelle-Guinée E.
C. biroi, Emery, Term. Füzet, Vol. 23, p. 332, pl. 8, f. 39-41 (1900) ♀ (nom. praeocc.).
41. *C. irritabilis*, Fred. Smith, Journ. Proc. Linn. Soc. Lond. Zool. Vol. 4, Nouvelle-Guinée.
suppl. p. 109 (1860) ♀.
C. irritabilis, Emery, Nova Guinea, Vol. 9, p. 253, fig. 2 (1911) ♀.
var. *le-guilloui*, Emery, Term. Füzet, Vol. 23, p. 331 nota (1900) ♀ (*C. le-guilloui*). Humboldt Bay.
C. irritabilis var. *le-guilloui*, Emery, Nova Guinea, Vol. 9, p. 253 (1911).
var. *subtilis*, Viehmeyer, Arch. f. Naturg. Vol. 79, A. 12, p. 32 (1913) ♀. Nouvelle-Guinée E.
42. *C. paradoxa*, Emery, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 63, Bull. p. 72, fig. (1894) ♀ (Pl. 3, Fig. 7). Nouvelle-Guinée E.
43. *C. polita*, Fred. Smith, Journ. Proc. Linn. Soc. Lond. Zool. Vol. 8, p. 74 Nouvelle-Guinée.
(1864) ♀.
C. polita, Emery, Term. Füzet, Vol. 23, p. 331, pl. 8, f. 36-38 (1900) ♀.

ESPÈCES NÉOTROPICALES ET NÉARCTIQUES

GROUPES *SORDIDULA* (*VICTIMA*, FRED. SMITH, ETC.), *BREVISPINOSA*, MAYR,
MONTEZUMIA, FRED. SMITH, *DISTANS*, MAYR, *STOLLI*, FOREL

44. *C. abstinentia*, Forel, Biol. Centr.-Amer. Hym. Vol. 3, p. 85 (1899) ♀. Panama, Bahia.
var. *suturalis*, Forel, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 19, p. 216 (1912) ♀. Vénézuéla.
45. *C. arata*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 37, p. 140 (1905) ♀. Argentine.
C. (Neocrema) arata, Santschi, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 182 (1918).

(1) Ce groupe a été érigé tout récemment en sous-genre, sous le nom de *Rhachiocrema* par M. Mann (Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, Vol. 63, N. 7, p. 318, Décembre 1919). Type : *C. wheeleri*, Mann.