

- var. *foraminicipoides*, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 24, p. 406 (1916) ♀ (*vulcania* Rhodesia.
st. *godefroyi* var.).
C. sjöstedti st. *godefroyi*, var. *foraminicipoides* Santschi in litt.
- var. *pudica*, Santschi, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 84, p. 499 (1916) ♀ (*bulawayensis* Rhodesia.
st. *infaceta* var.).
C. sjöstedti st. *godefroyi*, var. *pudica* Santschi in litt.
- var. *pulla*, Santschi, Voy. Alluaud & Jeannel, Afr. or. Hym. p. 94 (1914) ♀. Afrique or. anglaise.
subssp. *infaceta*, Santschi, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 84, p. 498 (1916) ♀ (*bulawayensis* Rhodesia.
C. sjöstedti, st. *infaceta*, Santschi, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 184 (1918).
subssp. *kohliella*, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 24, p. 409 (1916) ♀ (*excisa*, st. *andrei*, var.). Congo.
C. sjöstedti, st. *kohliella*, Santschi, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 185 (1918).
subssp. *oracum*, Forel, Rev. Zool. Afr. Vol. 2, p. 323 (1913) ♀ (*gallicola* var.). Congo, Rhodesia.
C. gallicola st. *oracum*, Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. Vol. 50, p. 237 (1914).
C. sjöstedti st. *oracum*, Santschi, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 185 (1918).
170. *C. solers*, Forel, in Schultze, Zool. Anthropol. Reise Afr. Formicid. p. 7 Gross Namaland.
(1910) ♀.
171. *C. stigmata*, Santschi, Boll. Labor. Zool. Scuola Agr. Portici, Vol. 8, Nigérie.
p. 344, fig. 15 (1914) ♀ ♂.
172. *C. vulcania*, Santschi, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 413 (1912) ♀. Afrique or. anglaise,
C. vulcania, Santschi, Voy. Alluaud & Jeannel, Afr. or. Hym. p. 94, fig. 13 (1914) ♀ ♀ ♂.
C. vulcanica (p. *vulcania*), Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 57, p. 124 (1913).
173. *C. wellmani*, Forel, ibidem, Vol. 53, p. 64 (1909) ♀, nec ♀.
var. *weissi*, Santschi, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 78, p. 376 (1909) ♀.
C. wellmani var. *weissi*, Santschi, ibidem, Vol. 84, p. 500 (1916) ♀.
subssp. *retusa*, Santschi, ibidem, p. 500 (1916) ♀ ♀ ♂. Rhodesia.
174. *C. wernerii*, Mayr, Sitz. ber. Akad. Wiss. Wien, Vol. 106, Abt. 1, p. 388 (1907) ♀.
C. alulai subsp. *wernerii*, Emery, Boll. Labor. Zool. Scuola Agr. Portici, Vol. 10, p. 11 (1915).
var. *cacozaela*, Santschi, ibidem, Vol. 8, p. 342 (1914) ♀ (*C. cacozaela*). Guinée française.
C. wernerii var. *cacozaela*, Santschi, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 84, p. 253 (1915).
var. *pasitheia*, Santschi, ibidem, Vol. 84, p. 253 (1915) ♀. Bas Dahomey.

ESPÈCES DE LA RÉGION INDIENNE CONTINENTALE ET INSULAIRE

175. *C. abdominalis*, Molschulsky, Bull. Soc. Natur. Moscou, Vol. 36, p. 20 Hindoustan.
(1863) ♀.
176. *C. apicalis*, Molschulsky, ibidem, Vol. 36, p. 20 (1863) ♀ nec Fred. Smith. Ceylan.
177. *C. bison*, Forel, Arch. f. Naturg. Vol. 79, A. 6, p. 195 (1913) ♀. Formose.
(anomalie de *C. rogenhoferi*, Mayr ?)
178. *C. brunnea*, Fred. Smith, Journ. Proc. Linn. Soc. Lond. Zool. Vol. 2, Bornéo.
p. 75 (1857) ♀ (*brunneus*) (1).
C. brunneus, Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus. Vol. 6, p. 138 (1858) ♀.
C. brunea, Dalla Torre, Cat. Hym. Vol. 7, p. 80 (1893).
var. *nicévillei*, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 10, p. 208 (1902) ♀ (*subnuda* st. *rabula*, Bengale.
var. *nicévillei*)
C. subnuda st. *rabula* var. *nicévillei*, Forel, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. Vol. 14, p. 684 (1902) ♀.
var. *nilgirica*, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 10, p. 208 (1902) ♀ (*subnuda* st. *rabula*, Coonoor.
nilgirica).
C. subnuda st. *rabula* var. *nilgirica*, Forel, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. Vol. 14, p. 684 (1902) ♀.

(1) A la suite de sa description de *C. contemta*, Mayr, dit que *C. brunnea*, Fred. Smith, paraît se rapprocher beaucoup de cette espèce. Je possède un exemplaire de *C. brunnea*, qui provient des collections du British Museum et que Fred. Smith lui-même m'a envoyé autrefois. Cet exemplaire est à peu près identique à la forme connue sous le nom de *rabula*, Forel et qui est extrêmement voisine de *contemta*, Mayr. J'appelle donc *C. brunnea*, Fred. Smith, le groupe de formes qui était désigné par M. Forel sous le nom de *C. subnuda*, Mayr.