

2° groupe : corselet de la femelle plus ou moins déprimé ; épaules du pronotum visibles en dessus ; mandibules de la femelle non striées, tandis qu'elles le sont chez l'ouvrière : *T. caespitum ferox* RUZSKY et ses variétés.

3° groupe : corselet de la femelle comme dans le groupe précédent ; mandibules striées chez la femelle comme chez l'ouvrière ; épaules du pronotum plus ou moins marquées chez l'ouvrière : *T. caespitum semilaeve* ANDRÉ, *T. caespitum punicum* F. SMITH, *T. caespitum maurum* SANT., *T. caespitum biskrense* FOR., *T. caespitum himalayanum* VIEHM. et variétés.




Fig. A.

1. — *T. caespitum caespitum* ♀, corselet vu de dos.
2. — " *semilaeve* ♀, id.
3. — " *caespitum* ♀, profil dorsal du corselet
4. — " " var. *impura* (Pyrénées) ♀, id.
5. — " *maurum* ♀, id.
6. — " *biskrense* var. *brevicornis* (Corse) ♀, id.
7. — " " type ♀, id.
8. — " *semilaeve* (Banyuls) ♀, id.
9. — " *inermis* var. *armata* ♀, id.
10. — " *semilaeve* var. *jugurtha* ♀, pédicule.
11. — " " type (Banyuls) ♀, id.
12. — " " (Iles Tremiti) ♀, id.

Les fig. 1, 2, 3, 4 sont à l'échelle de 12/1; toutes les autres de 17/1.