

*pitum biskrense* var. *debilis* EMERY (2), *T. caespitum semilaeve* ANDRÉ (5), *T. caespitum punicum* var. *cyrenaica* n. (1).

Une forme voisine de ce type, mais plus courte, est donnée par *T. caespitum ferox* RUZSKY type (9) et par sa var. *diomedea* EMERY (4).

La tête de *T. caespitum biskrense* FOR. (7) et var. *brevicornis* (6) est courte et arrondie derrière, avec les angles occipito-latéraux effacés. La tête du ♂ de *T. caespitum semilaeve* var. *atlantis* SANT. a la forme de celle de *biskrense*.

Ce dernier caractère est encore plus accentué chez *T. caespitum himalayana* VIEHM. (8) et *tenuicorne* EMERY (3), accompagné par des yeux énormes.

Je ne connais pas les ♂ des formes canariennes, hormis une var. nouvelle de *semilaeve* (*fortunatarum*) que je décrirai plus bas et qui est remarquable par sa forme plutôt allongée et arrondie en arrière (fig. D, 17).

Mes résultats s'accordent assez bien avec ceux de mon analyse des caractères des femelles.




Fig. C. — 1-3. *T. caespitum tsushimae* :

1. Pédoncule de l'♀; 2. profil du corselet et du pédicule de la ♀;  
3. pédicule de la ♀.

4-6. *T. caespitum ferox* var. *strialiceps* ♀ :

4. Devant de la tête (échelle de 1/22); 5. profil du pédicule.  
6. le même vu du dos.

(Toutes les figures, hormis 4, sont à l'échelle de 17 1).