

Description des formes que je crois nouvelles.

**T. caespitum caespitum var. fusciclava n.**

Ouvrière. — Brun foncé, corselet plus clair, mandibules rousses, pattes, antennes et extrémité du gastre brun clair, massue plus foncée. Tête allongée, ridée finement et régulièrement en long ; ces rides sont un peu inégales, surtout en arrière ; réticulation fondamentale distincte entre les rides. Dos du pronotum avec des rides plus grossières et beaucoup moins régulières que celles de la tête ; les rides deviennent beaucoup plus espacées et plus forte sur le mésonotum et sur la base de l'épinotum ; les flancs du corselet sont ridés longitudinalement ; épines médiocres. Forme du pédicule comme chez le type ; nœud du pétiole ridé transversalement en dessus ; postpétiole longitudinalement ; gastre lisse. — Long. : 2,6-2,8 mm.

Riccione près Rimini, 3 ouvrières (L. EMERY leg.).

**T. caespitum subsp. tsushimae n. fig. C, 1, 2, 3.**

Ouvrière. — Se distingue surtout du type par les nœuds du pédicule étroits et allongés ; le postpétiole peu plus large que le nœud du pétiole. Couleur brun rougeâtre très foncé, corselet moins foncé. mandibules, antennes et pattes brunes, articulations et funicule testacés. Scape n'atteignant pas le bord occipital ; article du funicule 2-5 plus courts que larges ; épistome ridé, à ride médiane proéminente ; le dessus de la tête est fortement et régulièrement strié (ou ridé) en long ; on y distingue des rides principales et des rides accessoires ; la réticulation fondamentale est très distincte entre les rides, ce qui donne à la surface de la tête un aspect submat. Le corselet à la même sculpture mais plus grossière ; épaules du pronotum anguleuses ; impression mésoépitonale marquée ; épines de l'épinotum fortes. Les nœuds sont luisants au sommet ; le gastre est lisse. — Long. : 2,8-3,2 mm.

Femelle. — Tête un peu plus large que longue ; sculpture comme celle de l'♂, mais plus grossière. Corselet ayant à peu près la forme de var. *impura* ; mésonotum lisse antérieurement, finement strié sur la partie basale ; scutellum strié. Pédicule rugueux, beaucoup plus étroit que dans le type *caespitum* ; nœud du pétiole aigu au sommet qui est tronqué et même plus ou moins échancré ; de l'échancrure part une petite carène longitudinale sur la face postérieure du nœud (on aperçoit un vestige de cette carène chez l'ouvrière). Couleur de l'♂. — Long. : 6,5 mm.