

Ile de Tsushima (leg. FRUHSTORFER) : nombreuses ♀, une ♀ ; une ♂ de Pékin (ma coll.). Probablement cette forme est répandue dans tout l'extrême Orient.

***T. caespitum ferox* var. *striaticeps* n. fig. C, 4, 5, 6.**

Femelle. — Brun roux, extrémités et pédicule plus clairs. Ressemble au type de la sous-espèce, avec les différences suivantes : la tête est un peu plus large, finement mais profondément striée en long (aussi l'épistome), mate ; les mandibules montrent un vestige de stries entre les points ; les antennes sont plus courtes, le scape récliné est distant du bord occipital d'environ le double de son diamètre. Corselet allongé, épaules du pronotum saillantes, mésonotum plat, luisant ; la base du mésonotum et l'écusson sont très finement et superficiellement striés ; épines épinoles un peu plus courtes. Les deux segments du pédicule sont plus étroits que chez le type de *ferox* ; de longs poils aux nœuds, comme chez le type. — Long. : 7 mm. ; sans le gastre 4,8 mm. ; tête (sans mandibules) 1,3 × 1,4 mm. ; corselet 2,4 × 1,4 mm.

Bochara, une ♀ (leg. Oscar SCHNEIDER).

***T. caespitum* subsp. *tenuicornis* n. fig. B, 3 ; D, 2, 3, 12.**

T. caespitum var. KARAVAEV, *Horae Soc. Ent. Ross.*, volum. 39, p. 51, fig. 23 (genit. ♂).

Ouvrière. — Remarquable par sa forme élancée, encore davantage que dans *T. caespitum himalayanum* VIEHM. Tête (sans mandibules) environ d'un quart plus longue que large, finement et régulièrement striée ; les stries font jusqu'à la face occipitale ; pointillée au fond des stries, ce qui donne à la surface de la tête un aspect mat. Scape atteignant presque le bord occipital ; funicule long, massue mince (fig. D, 2). Dos du corselet strié en long, le devant du pronotum est luisant, la ponctuation étant nulle en ce point dans le fond des stries. Epines aiguës et relevées ; impression méso-épinotale légère. Nœuds peu inégaux de largeur, celui du pétiole avec un bord antérieur net ; gastre lisse. Couleur brun clair, tête plus foncée, extrémités jaune testacé. Long. : 3,4 mm.

Mâle. — Brun clair, tête et scutellum noirâtres, extrémités pâles. Tête à peu près comme *himalayanum*, c'est-à-dire large et à bord arrondi derrière les yeux (fig. B, 3), mate, ponctuation serrée qui conflue en stries. Mésonotum lisse en avant jusqu'au sillon de Mayr, strié au