

delà de ces sillons, scutellum lisse. Pétiole à nœud cunéiforme, ayant le bord supérieur droit et une légère encoche au milieu ; postpétiole d'un tiers plus large que le nœud du pétiole. — L. 5 mm.

Transcaspienne, Repetek, une ♀, un ♂, reçus de M. KARAVAEV sous le n° 1822 et avec l'étiquette : *Tetr. caespitum*.

T. caespitum punicum var nitidissima n. fig. D, 6, 8.

T. caespitum punicum var. lucidula KARAVAEV, *Horae Soc. Ent. Ross.*, vol. 39, p. 54, fig. 25 (1909), nec EMERY.

Ouvrière. — Deux exemplaires de cette forme m'ont été envoyés par M. KARAVAEV sous le nom de var. *lucidula* EMERY. Ils diffèrent de cette var. principalement par la forme du corps plus étroite, les nœuds du pédicule beaucoup plus larges (j'ai dessiné, fig. D, 7 les nœuds de l'♀ du type de var. *lucidula*) et par la sculpture plus lisse. La tête (sans mandibules) est d'un quart plus longue que large, lisse et très luisante, y compris l'épistome, seulement la partie antérieure des joues et du front est striée ; l'épistome est caréné. Le scape n'atteint pas le bord occipital. Le dos du pronotum est lisse, sans vestige de stries ; l'épinotum est très superficiellement irrégulièrement substrié, et cette sculpture s'étend à la partie postérieure du mésonotum ; les flancs du corselet sont ponctués mais luisants. Les dents de l'épinotum sont très petites. Les nœuds sont lisses et très luisants. — L. 2, 6 mm.

Transcaspienne, Firiusa. KARAVAEV décrit l'♀ et la ♀ et figure la ♀.

T. caespitum semilaeve var. fortunatarum n. fig. D, 13-18.

T. caespitum EMERY, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, vol. 62, p. 84 (1893).

Ouvrière. — Jaune testacé, tête un peu plus foncée, gastre quelquefois rembruni (exemplaires de Ténérife). Tête d'un cinquième plus longue que large, très luisante, superficiellement striée en avant, quelques stries se prolongent plus ou moins en arrière, semée de points épars. Épistome strié sans carène médiane. Scape loin d'atteindre le bord occipital, distant de celui-ci d'environ $2\frac{1}{2}$ fois son diamètre. Pronotum et mésonotum finement striés, submats, épinotum et côtés du corselet réticulés ; mésonotum assez déprimé ; dents de l'épinotum très petites (plus ou moins fortes chez les exemplaires de Ténérife). Pétiole courtement pédonculé, nœuds lisses, presque d'égale largeur. Poils obtus. — L. 2,6-2,9 mm.