

*T. erratico-nigerrimum* a la priorité sur *T. simrothi*; mais c'est un *nomen nudum*, tandis que *T. simrothi* a une description très mauvaise<sup>1</sup>, j'en conviens, un semblant de description, mais qui, je crois, est suffisant parce que l'espèce provient d'un pays, la Sardaigne, où il n'existe pas d'autre Fourmi de ce genre. Je présume que la Fourmi de Sardaigne déterminée par KRAUSSE *T. erraticum* typique est fondée sur de petits individus de *simrothi* qu'on ne peut que difficilement distinguer de *T. erraticum*. L'armure génitale des mâles des deux espèces est caractéristique; or je n'ai jamais vu de Corse, ni de Sardaigne, un seul mâle de *T. erraticum*.

*Tapinoma simrothi simrothi* Krausse.

Ouvrière (fig. 2, A, B). Beaucoup plus glabre que *T. nigerrimum*, et par conséquent plus luisante; moins trapue, tête des individus les plus gros un peu plus longue que large (1<sup>mm</sup>,2 × 1<sup>mm</sup>,1), distinctement plus étroite devant chez les grandes et les petites ouvrières. Epinotum déprimé, son profil arrondi en large courbe, sans trace d'angle. Couleur de l'espèce précédente.

Longueur = 2<sup>mm</sup>,5 à 3<sup>mm</sup>,5.

Les petits exemplaires sont difficiles à distinguer de *T. erraticum*, mais ils ont les antennes plus grêles et les premiers articles du funicule plus allongés.

Femelle (fig. 2, C). Facile à distinguer de *T. nigerrimum* par sa taille moins grande et par sa tête plus étroite. Tête à peu près aussi longue que large ou à peine plus large que longue (1<sup>mm</sup>,1 à 1<sup>mm</sup>,3); les exemplaires de Corse et de Sardaigne sont parmi les plus petits et peuvent aisément passer pour *T. erraticum*, si l'on n'a pas les ouvrières correspondantes. Elles se distinguent aussi de *T. erraticum*, comme les ouvrières, par la structure de leurs antennes.

Longueur = 4<sup>mm</sup> à 6<sup>mm</sup>.

Mâle (fig. 2, D, E). Tête un peu plus petite que chez *nigerrimum* (largeur 0<sup>mm</sup>,9 à 1<sup>mm</sup>), aussi longue que large, ou à peine plus longue que large. Armure génitale beaucoup moins volumineuse et moins massive que chez *nigerrimum*; squamula plus courte, son angle inféro-médian aigu et plus ou moins saillant en arrière; stipes

<sup>1</sup> KRAUSSE (loc. cit.): « Eine Varietät von *Tapinoma erraticum* Ltr. klopfte ich von Wolfmilchblüthen; sie gleicht dem *T. erraticum*, nähert sich aber in der Grösse dem *T. erraticum nigerrimum*. »