

## TABLE POUR LA DÉTERMINATION DES ESPÈCES: OUVRIÈRES.

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. Bord antérieur de l'épistome étroitement incisé . . . . .  | 2                                    |
| — Bord antérieur de l'épistome entier ou seulement sinué . . . . .  | 9                                    |
| 2. Petite taille (2 <sup>mm</sup> ,2 à 3 <sup>mm</sup> ); tête peu plus longue que large chez les petites ♀, à peu près aussi longue que large chez les grandes; articles du funicule courts. Asie centrale |                                      |
| <i>T. breve</i> n.  |                                      |
| — Tête notablement plus longue chez les petites ♀, ou bien articles du funicule plus allongés . . . . .   | 3                                    |
| 3. Profil de l'épinotum plus ou moins anguleux et proéminent . . . . .  | 4                                    |
| — Profil de l'épinotum arrondi et moins proéminent . . . . .  | 6                                    |
| 4. Tête de l'♂ maxima grande et large (largeur 1 <sup>mm</sup> ,3), notablement rétrécie devant. Espèce occidentale.  |                                      |
| <i>T. nigerrimum</i> Nyl.   |                                      |
| — Tête de l'♂ maxima plus petite (largeur 1 <sup>mm</sup> ), moins rétrécie devant. Espèces orientales . . . . .  | 5                                    |
| 5. Corselet plus allongé, face descendante de l'épinotum plus longue (voir la fig. 10 B) . . . . .  | <i>T. israelis</i> For.              |
| — Corselet plus court, face descendante de l'épinotum plus courte (fig. 11, A) . . . . .  | <i>T. tauridis</i> n.                |
| 6. Funicule des antennes à articles relativement courts.  |                                      |
| <i>T. erraticum</i> Latr. et ses sous-espèces et var.   |                                      |
| — Funicule des antennes (au moins chez les grandes et moyennes ♀ ♀) à articles relativement allongés. Groupe <i>simrothi</i> .  | 7                                    |
| 7. Epinotum très déprimé. Corse, Sardaigne, Sicile, Afrique méditerranéenne . . . . .   | <i>T. simrothi simrothi</i> Krausse. |
| — Epinotum pas très déprimé . . . . .   | 8                                    |
| 8. Funicule moins grêle. Orient méditerranéen.  |                                      |
| <i>T. simrothi</i> var. <i>phoenicea</i> n.   |                                      |
| — Funicule plus grêle; 2 <sup>me</sup> article distinctement plus long que le 3 <sup>me</sup> . Asie centrale . . . . .   | <i>T. simrothi karavaievi</i> n.     |
| 9. Jaune ou brun; bord antérieur de l'épistome sinué. Mandchourie, Chine . . . . .  | <i>T. sinense</i> n.                 |
| — Noir; bord antérieur de l'épistome entier. Midi de la France, Piémont . . . . .   | <i>T. pygmaeum</i> Duf.              |