

TABLE POUR LA DÉTERMINATION DES ESPÈCES: MÂLES.

1. Angle inféro-médian de la squamula à peu près droit; stipes volumineux, non ou peu courbé en dedans, recouvrant presque en entier la volselle *T. nigerrimum* Nyl.
- Angle inféro-médian de la squamula aigu ou prolongé en appendice droit ou crochu 2
2. Stipes long et mince, courbé fortement en dedans, formant avec celui du côté opposé une sorte de tenaille 3
- Stipes plus court, non ou peu courbé, pas en tenaille 4
3. Angle inféro-médian de la squamula aigu, plus ou moins proéminent, mais ne formant pas un appendice.
T. simrothi simrothi Krausse et var. *phoenicea* n.
- Angle inféro-médian prolongé en un appendice étroit et presque droit *T. simrothi karavaievi* n.
4. Appendice de l'angle inféro-médian droit ou courbé, mais pas crochu 5
- Appendice de l'angle inféro-médian crochu 7
5. Lobes de la lame sous-génitale arrondis et pas plus larges que l'encoche cunéiforme qui les sépare 6
- Lobes de la lame sous-génitale subtronqués et plus larges que l'espace étroit qui les sépare (voir fig. 6, F).
T. erraticum erraticum Latr.
6. Appendice de l'angle inféro-médian massif, pas courbé. Rhodes.
T. simrothi festae n.
- Appendice de l'angle inféro-médian également massif, mais courbé en dehors. France. *T. erraticum ambiguum* n.
7. Tête large en arrière; stipes pointu; volselle de forme ordinaire. Crimée *T. tauridis* n.
- Tête rétrécie en arrière; stipes obtus; volselle très longue, de forme étrange (voir la fig. 13, B). Sarepta. *T. christophi* n.