

allongé et marqué sur le dos d'une encoche méso-épinotale plus ou moins prononcée, mais qui habitent des aires géographiques différentes.

Les espèces qui ont le dos du corselet continu chez les ouvrières sont plus faciles à grouper et se partagent naturellement en un groupe occidental (hispano-provençal) et un groupe oriental (Crimée [Caucase?], Syrie, Asie centrale). Le premier comprend *meridionalis*, *hispanicus* et *saundersi*, le deuxième *communista*, *syrius* et *kusnezovi*.

\* \* \*

A. — Profil du corselet de l'ouvrière continu, c'est-à-dire n'étant pas interrompu par une encoche méso-épinotale.

**B. meridionalis** (Roger), Emery emend. fig. A, 1, B, 1, C, 1.

*B. meridionalis*, Roger, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 7, p. 167 (1863) part.: Emery, Bull. Soc. Ent. Ital., vol. 47, p. 213, fig. 67 *c, d*, nec fig. 67 *a, b* (1916); Santschi, Rev. Zool Afr., vol. 7, p. 204, ♂ nec ♀, nec pl. 11, fig. 1 (1920).

Ouvrière. — D'un jaune un peu brunâtre uniforme. Pubescence peu dense; quelques poils sur le devant de la tête et sur les segments postérieurs du gastre. Tête allongée, à côtés peu arqués, à peu près parallèles; angles postérieurs arrondis; yeux relativement petits, nettement séparés du bord latéral lorsqu'on regarde la tête d'en haut. Mandibules à deux dents terminales<sup>1</sup> beaucoup plus grandes que celles qui garnissent le reste du bord masticateur; les deux ou trois dents qui suivent sont beaucoup plus petites que les terminales, mais plus fortes que les dents irrégulières et plus ou moins rudimentaires qui sont plus en arrière. Antennes relativement courtes; le scape dépasse le bord occipital d'un sixième environ de sa longueur; les deux premiers articles du funicule sont à peu près égaux; le premier un peu plus long que le deuxième; les articles suivants sont plus courts, à peu près aussi épais que longs. Le corselet est court et haut; pas d'impression sur la suture méso-épinotale. — L. 2 — 2,2 mm. — Je n'ai vu qu'un petit nombre d'exemplaires de l'♂ et je n'ai pas noté de différence remarquable dans la forme de la tête.

Femelle. — Brun foncé, mandibules et membres jaunâtres.

<sup>1</sup> Roger et Forel décrivent deux ou trois dents terminales. Je n'ai jamais vu, dans toutes les espèces de *Bothriomyrmex* que j'ai examinées, que deux dents terminales notablement plus grandes que les autres.