

aussi petits que chez le type. Les articles des antennes notablement plus allongés. — L. 2-2,5 mm.

Une ouvrière géante, ou si l'on préfère l'appeler ainsi, une ergatogyne, a la tête encore plus allongée, mais les yeux pas plus grands que chez l'ouvrière normale et le corselet beaucoup plus allongé, avec le scutum du mésonotum différencié (fig. A 4 b).

Turcoménie: Merw, Bagir (N. Kusnezov leg.).

Il est vraisemblable que la Fourmi du voyage Fedtschenko, déterminée par Mayr comme *B. meridionalis*, se rapporte à cette forme.

B. KUSNEZOVI n. sp., fig. A 5.

Ouvrière. — Brun grisâtre moyen, corselet et membres jaunâtres; pubescence plutôt longue, clairsemée. Tête peu plus longue que large, à peu près rectangulaire, avec les côtés arqués et les angles postérieurs arrondis; yeux plutôt grands, exactement latéraux, c'est-à-dire que, regardant la tête de face, le contour des yeux est coupé par le bord latéral. Scape dépassant de peu le bord occipital; articles du funicule de peu plus courts que chez *turcomenicus*. Corselet court et trapu, sans encoche dorsale entre le mésonotum et l'épinotum. J'aperçois un vestige de suture (au moins sur un exemplaire) qui sépare le disque du mésonotum (fig. A 5 a). — L. 2,2 mm.

Turkestan russe, prov. Syr-Daria, montagnes de Duany Tau (N. Kusnezov leg.). Deux exemplaires endommagés, sauf la tête qui est en bon état. Cette espèce est caractérisée par la forme de la tête et les yeux tout à fait latéraux. Ces faits, ainsi que la suture qui sépare le disque métanotal, feraient peut-être regarder ces exemplaires comme ergatogynes.

B. — Profil du corselet de l'ouvrière interrompu par une encoche méso-épinotale plus ou moins marquée.

B. corsicus, Santschi, fig. A 6, B 4.

B. meridionalis var. *corsica*, Santschi, Boll. Real Soc. Esp. Hist. Nat., vol. 23, p. 156 (1923) ♀.

Ouvrière. — A peu près de la même couleur que *gallicus* (voir plus loin). Diffère de celui-ci par sa tête plus allongée, à côtés plus parallèles. Ses antennes sont aussi un peu plus allongées; le scape dépasse le bord occipital d'un cinquième de sa longueur. Épinotum comme chez *gallicus*. — L. 2,2 mm.

Femelle. — La femelle a été décrite par Santschi d'après