

que chez *meridionalis*. — L. 2,7-3 mm.; sans le gastre 1,8 mm.

Mâle. — Tête un peu plus large que longue (6/5); rétrécie pas très fortement derrière les yeux et très obtusément tronquée en arrière. Le scape atteint l'ocelle postérieur et dépasse le contour externe de l'œil du tiers de sa longueur. L'armure génitale de *B. corsicus gallicus* est très différente de celle de *B. meridionalis*: par les volselles plus courtes que les stipes, plus grêles et plus courbées à l'extrémité, où elles forment chacune un crochet; par les sagittæ dont le profil forme une simple courbe. — L. 1,7-2 mm.

Cette Fourmi a été trouvée dans plusieurs localités du bassin du Rhône et de ses affluents: Petit-Salève près Genève (Forel), environs de Genève (Tournier, Abeille de Perrin), Marseille (Abeille de P.), Dijon (Rouget). Cette dernière localité mérite d'être particulièrement notée, car ce même entomologiste y a trouvé plusieurs Fourmis méridionales, par exemple *Aphænogaster gibbosa*, Latr. et *splendida*, Roger.

Je rattache cette Fourmi comme sous-espèce à l'espèce *corsicus*, Santschi, quoique la femelle de celle-ci ait la tête beaucoup plus allongée. Mais l'ouvrière diffère en peu de chose de celle de *gallicus*. — On verra si le mâle de *corsicus*, qui est encore inconnu, confirmera cette manière de voir.

**B. corsicus** LATICEPS n. subsp., fig. A 9.

Ouvrière. — Couleur des exemplaires foncés de *gallicus*. Très distincte par la forme de sa tête, qui est courte, à côtés arqués et avec les angles postérieurs très arrondis. Son corselet est relativement trapu, l'épinotum peu déprimé, avec sa face déclive plus abrupte que dans les formes précédentes, la face basale plus grande, plus droite sur le profil et formant avec la face déclive un angle distinct, mais émoussé. Les articles du funicule sont plus allongés que chez les formes précédentes, les articles 3-6 plus longs qu'épais. — L. 2,2 mm.

Pyrénées, sans autre indication de localité; deux exemplaires dont l'un sans tête (Muséum National de Paris: coll. Pandellé).

Je rattache cette Fourmi, du moins provisoirement, à *B. corsicus*, pour ne pas trop multiplier les espèces, attendant que la découverte des formes sexuées vienne nous éclairer.

**B. gibbus**, Soudek, fig. A 12, B 6, C 7.

*B. meridionalis gibbus*, Soudek, Přispěvky k vědeckému poznání Moravského krasu. — III-1924.

Ouvrière. — Tête et gastre brun châtain plus ou moins