

plus d'un sixième de sa longueur; articles 3-6 du funicule un peu plus longs qu'épais. Corselet allongé, à peu près comme chez *gallicus*, avec une impression dorsale un peu plus faible que chez cette forme. — L. 2,2-2,6 mm.

Femelle. — Jaune-brun, extrémités plus claires, gastre noirâtre. Tête remarquablement courte, rectangulaire. Mandibules comme chez l'ouvrière. Scape dépassant de peu le bord occipital; funicule comme chez l'ouvrière. — L. 2,2 mm.; sans le gastre, 1,4 mm.

♂. Mâle. — Brun foncé, mandibules et extrémités testacées. Tête peu plus large que longue; les yeux occupent à peine la moitié des côtés de la tête; à partir des yeux, le contour postérieur-latéral de la tête est arrondi. Le scape ne dépasse le contour externe de l'œil pas même du tiers de sa longueur et n'atteint pas l'ocelle pair. Ailes très légèrement enfumées. — L. 2,2 mm.

Habite l'Istrie et la Dalmatie avec les îles; Forel a trouvé cette Fourmi à Patras, en Grèce. La description de la femelle a été faite d'après un individu unique de la coll. Mayr (Musée de Vienne), provenant de Dalmatie; à mon avis, un très petit individu; la femelle normale est probablement de couleur plus foncée et doit avoir la tête plus allongée. Le seul mâle que j'aie vu a été capturé isolément à Momiano (Istrie) par le Dr Finzi; il manque d'armure génitale.

B. adriacus ANATOLICUS n. subsp., fig. A 11.

B. meridionalis atlantis (partim), Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., vol. 47, p. 350 (1911).

Ouvrière. — Coloration comme le type. En diffère par ces points: la tête est un peu plus allongée et le scape dépasse le bord occipital d'un cinquième de sa longueur; les yeux sont un peu plus petits; les articles 3-6 du funicule sont très distinctement plus épais que longs et le deuxième article n'est pas aussi allongé que chez le type: le corselet est un peu plus trapu et l'encoche méso-épinotale plus marquée. — L. 2-2,4 mm.

Ismid près Smyrne (coll. Forel au Muséum de Genève). Je rattache provisoirement cette forme à *B. adriacus*, attendant la découverte des sexués, pour décider si les différences de l'♂ méritent la fondation d'une espèce.

B. adriacus IONIUS n. subsp.

Ouvrière. — Brun rougeâtre, tête un peu plus foncée, membres jaunâtres, gastre plus ou moins noirâtre. Tête beaucoup