

*B. Heeri FOREL* § . Descriptio mea (l. c. p. 92) ut sequitur paulo emendanda est : « L. 1,2 — 2,2 mill. Pedes sat breves ».

♀ (nondum est descripta). L. 3,7 — 4,5 mill. Caput postice leniter solum emarginatum. Mandibulæ, palpi, clypeus, area frontalis, sulcus frontalis, laminæ frontales, petioli squama, metanotum, pedes sicut in § . Antennæ flagelli articuli primus et ultimus paulo breviores quam in § . Abdominis segmentum primum antice supra paullo productum, petiolum cum squama obtegens (ut in § ). Brunneo vel rufo-flavescens ; in individuis pallidissimis, abdominis segmenta postice et caput superne solum obscuriora ; in individuis obscurissimis corpus supra ubique brunneum ; mandibulæ clypeusque semper rufescens ; pedes antennæque flavobrunnea. Corpus subtilissime (ruguloso ?) punctulatum, abdomine crebrius ruguloso-punctulato, clypeo et metanoti superficie declivi laevibus. Subnitida, abdomine opaco, densissime griseo-pubescente, excepto. Caput, thorax, pedes, antennæ minus dense griseo-pubescentia ; clypeus et metanoti, superficies declivis glabra. Caput, thorax et abdomen erecte pilosa ; pedes antennæque absque pilis erectis.

♂ (nondum est descriptus). L. 1,5—2 mill. Corpus sub breve. Caput parvum, postice leniter concavum. Mandibulæ apice acuto. Clypeus non carinatus, inter antennarum insertiones non intersertus. Laminæ frontales externe concavæ. Sulcus frontalis distinctus. Antenna brevis, scapo articulos sex primos flagelli una sumptos longitudine æquante. Alæ 1,7-2,2 mill. longitudinis, hyalinæ, costis et stigmate pallidis. Abdomen parvum, segmento primo antice supra non producto. Pallide-flavescens, vix partim rufescens. Valvulae genitales exteriore et alarum margo posterior copiose, caput mesonotumque superne abdomen postice et inferne sparse, corporis partes alteræ haudquaquam erecte pilosa. Corporis superficies inferior sparsissime, mesonotum frons et vertex modice, abdomen (supra) antennæ et pedes paullo densius flavidio-pubescentia ; pili adpressi subtilissimi. Metanotum, scutellum, clypeus, area frontalis, thoracis latera nitida, fere laetitia et glabra. Mesonotum, fons, vertex, pedes, antennæ, abdomen et thoracis superficies inferior subtilissime (ruguloso ??) punctulata. Genæ partim rugosæ.

*Patria* : Probabiliter America centralis.