

Aphaenogaster (?) Schaufussi

Forel n. sp.

L. 3,5 — 4,0 mm.

Mandibeln 5 (?) zählig. Clypeus gewölbt, ungekielt, hinten gerundet, zwischen den Stirnleisten eingeschoben. Fühler 12gliedrig; Schaft an der Basis gekrümmt; Geissel mit einer 3gliedrigen, dicken Keule; Endglied sehr gross. Stirnfeld dreieckig, schlecht begrenzt. Eine sehr schwache Längsleiste an der Stelle der Stirnrinne. Stirnleisten ziemlich kurz aber ziemlich hoch, nach innen concav. Keine Ocellen. Augen und Kopfform wie bei *Myrmica*.

Thorax verhältnissmässig ziemlich kurz, kürzer als bei *Aphaenogaster subterranea*, hat aber Aehnlichkeit in der Form mit demjenigen dieser Art. Zwischen Meso- und Metanotum eine tiefe Einschnürung. Pro- und Mesonotum stehen deutlich höher als das Metanotum (doch weniger hoch als bei den anderen *Aphaenogaster*-Arten) und sind zusammen ziemlich stark verdickt, verbreitert, während das Metanotum stark verengt ist. Pronotum doppelt so breit als das Metanotum. Vorn ist aber das Pronotum wieder halsartig verengt. Metanotum mit zwei ziemlich langen nach oben, hinten und aussen gerichteten Dornen, mit etwas nach einwärts gekrümmten Spitzen.

Stielchen und Abdomen nichts Besonderes.

Beine mässig lang. Schenkel in der Mitte stark verdickt. Mittel- und Hinterbeine ohne Spornen. Der ganze Körper, ausser den Fühlern und den Mandibeln, mässig abstehend beborstet. Die Borsten sind weiss, keulenförmig und gezähnt, wie bei der Gattung *Leptothorax*. Anliegende Pubescenz sehr zerstreut an den Tibien und Tarsen; an den übrigen Stellen fast null.

Der ganze Körper glänzend mit Ausnahme des Metathorax und des Stielchens. Mandibeln längsgestreift. Wangen und Seiten des Kopfes längsgerunzelt. Einige stärkere