

Ce dernier l'a décrite avec ses mœurs (Trans. Amer. ent. Soc., 1877) sous le nom de *F. rufa* L. (Mound-making Ant of the Alleghennies). Elle fait d'immenses colonies composées de 1500 à 1800 nids considérables décrits et dessinés par Mac Cook.

**Formica rufa** race **obscuripes** n. st. — *Ouvrière*. Long., 3,8 à 8 mill. Très semblable à la *F. rufa i. spec.* d'Europe. Mais elle est plus petite; les grandes ouvrières sont d'un rouge plus clair et presque ou entièrement sans tache sur la tête et le thorax, tandis que les pattes et l'écaïlle sont d'un brun noirâtre. Les petites ouvrières sont beaucoup plus foncées et tachées de brun sur la tête et le thorax. L'abdomen est mat, noir, et a une pubescence grise un peu plus forte que chez la *F. rufa i. sp.*, tandis que la pilosité est plutôt un peu plus faible. — Green River, Wyoming (Scudder).

**Iridomyrmex Mac-Cooki** n. sp. (Forel Et. Myrm., 1878, p. 46). — *Ouvrière*. Long., 2 à 3 mill. Tête rectangulaire, à côtés presque parallèles, faiblement échancrée derrière. Echancrure méso-métanotale faible, évasée. Pronotum et mésonotum formant ensemble une voûte. Métanotum faiblement voûté, non élevé. Ecaïlle petite et étroite. Tout le corps luisant, très finement réticulé, faiblement pubescent, à pilosité dressée courte, assez éparse. Tibias et scapes pourvus d'une pilosité dressée courte. Jaune rougêâtre; extrémité des funicules et dents des mandibules brunâtres. Gésier comme chez les autres *Iridomyrmex*.

Texas, sur les nids du *Pogonomyrmex barbatus* (Mac Cook).

Cette espèce est voisine de *I. pilifer* Mayr, mais la tête a une autre forme.

**Platythyrea cineracea** n. sp. — *Ouvrière*. Long., environ 5,5 mill. Très semblable à la *P. sinuata* Roger, mais noire, avec l'extrémité de l'abdomen, les tarses, les articulations des jambes, les funicules, les mandibules, la base et l'extrémité des scapes, ainsi que la protubérance latérale des arêtes frontales, d'un roussâtre foncé. Les mandibules sont tranchantes, sans dents. Le nœud du pédicule, élargi en arrière, forme deux dents à ses angles postérieurs supérieurs; son bord postérieur supérieur, entre les dents, est arrondi, faiblement convexe au milieu. Une pubescence blanche, très courte, assez éparse. La ponctuation grossière (outre la dense ponctuation réticulaire) est surtout abondante sur le mésothorax, le métathorax, le pédicule, le 1<sup>er</sup> segment abdominal et les côtés de la tête. Suture clypeo-frontale nulle; sillon frontal à peine indiqué. Une dent sous le pédicule au quart postérieur de sa longueur. Palpes maxillaires de 6, labiaux de 4 articles.

Rapprochée aussi de la *P. pruinosa* Mayr. — Retaluleu, Guatémala (Stoll).