

cule brunâtres, tête rougeâtre. Pubescence presque nulle. Pilosité dressée longue, assez abondante partout, surtout sur les pattes et les antennes. Chaperon largement échancré au milieu de son bord antérieur, finement réticulé-punctué, *sans stries ni rides*. *Côtés du pronotum arrondis, ne formant pas trace de tubercule conique*. Epines du métonotum verticales, *étroites à leur base*. *Pattes luisantes*, très finement réticulées. Abdomen, comme tout le corps, très finement réticulé et mat; fond des réticulations abdominales granulé. En outre des rides longitudinales sur la moitié antérieure de la tête (sauf le chaperon), et des rides transversales éparses sur le thorax, surtout sur le pronotum. La forme générale et la taille rappellent celles de la *P. fallax*.

Ouvrière. Long., 3 à 4 mill. Efflanquée, brunâtre, plus foncée que le soldat. Tête distinctement rétrécie postérieurement en forme de cou. Tête, thorax et pédicule entièrement mats, finement réticulés-punctués; des rides longitudinales seulement sur les joues et le chaperon; des rides transversales seulement sur le pronotum. Aire frontale lisse et luisante. Abdomen et pattes faiblement réticulés-punctués, demi-luisants (un peu soyeux). Epines du métonotum étroites et assez longues. Mésonotum avec une faible impression transversale. Pronotum sans tubercules. Du reste comme le soldat.

Femelle. Long., environ 7 mill. Comme le soldat, mais il y a des rides longitudinales sur toute la tête et sur le mésonotum (outre la ponctuation réticulaire) et quelques stries obliques sur le chaperon. Pronotum, métonotum et pédicule fortement ridés transversalement (outre la ponctuation). Pattes luisantes finement réticulées, ailes un peu jaunâtres; nervures et stigmates pâles.

Mâle. Long., environ 4,3 à 4,5 mill. D'un jaune brunâtre pâle; abdomen, chaperon et une tache sur chaque côté du mésonotum plus foncés; reste de la tête d'un brun noirâtre. Mandibules tridentées. Tête finement réticulée-punctuée, presque mate derrière, avec quelques rides longitudinales. Thorax et pédicule demi-mats, finement réticulés-punctués; mésonotum ridé en long. Métonotum armé de deux tubercules mousses. Abdomen très luisant, très faiblement réticulé. La pilosité des pattes et des antennes est oblique et assez courte. — Ailes comme chez la femelle.

Antigua en Guatémala (Stoll). Sexes ailés le 23 décembre 1881.

Pheidole Susannæ n. sp. — *Soldat*. Voisine de *biconstricta* et *impressa*. Long., 3,8 à 4 mill. D'un jaune d'ocre; mandibules et antennes rougeâtres; pédicule et abdomen d'un jaune brunâtre; extrémité de l'abdomen brunâtre. Finement réticulée-punctuée et presque mate, sauf la moitié postérieure de l'abdomen, les angles