

postérieurs de la tête, les mandibules et en partie le chaperon qui sont lisses et luisants. En outre de grossières réticulations et rides longitudinales sur la tête et des rides transversales sur le thorax. Thorax conformé comme chez la *P. biconstricta*; une profonde impression sur le mésonotum, etc. — Chaperon caréné et échancré au milieu de son bord antérieur. Pilosité dressée, médiocrement abondante partout. Sur la tête il y a en outre une pubescence couchée assez éparsée, mais longue. Sur les pattes et les antennes les poils sont en partie presque entièrement couchés et en partie dressés, mais un peu obliques. La base de l'abdomen n'est pas striée comme chez *l'impressa*.

*Ouvrière*. Long., 2,5 à 2,8 mill. Tête fortement rétrécie postérieurement où elle se termine en un cou court, mais distinct. Lisse et luisante, sauf le mésothorax, le métathorax, la base du pédicule et en partie le cou qui sont réticulés-punctués et plus ou moins mats. Joues ridées. Forte impression mésonotale. Métanotum à petites dents pointues. Pilosité comme le soldat. Couleur un peu plus terne. La *P. biconstricta* ouvrière n'a pas la tête rétrécie derrière le cou.

Retaluleu en Guatémala (Stoll).

**Pheidole Susannæ** race **obscurior** n. st. — *Soldat*. Ne diffère de la précédente que par sa couleur entièrement d'un brun châtain, avec les tarses, les articulations des pattes et les antennes rougeâtres, par son thorax un peu plus fortement sculpté, plus mat, avec l'impression longitudinale du métanotum moins nette. Cette race ressemble plus à *l'impressa*. Long., 3,8 mill.

Rio de Janeiro (Nægeli).

**Pheidole fallax** Mayr race **columbica** n. st. — *Soldat*. Long., 5,5 mill. Diffère de la *Ph. fallax* typique par sa stature plus ramassée, sa tête plus grosse (plus large), plus fortement échancrée et en même temps bien plus rétrécie postérieurement. La sculpture est la même, mais plus forte, de sorte que la tête est entièrement mate. Les bouts postérieurs de la tête ont de larges points enfoncés, faibles, qu'on entrevoit aussi chez *fallax*. Le chaperon est à peine échancré à son bord antérieur, ferrugineuse; abdomen entièrement brun. Pédicule, métathorax et pattes d'un brun-roussâtre.

Colombie (M. Landebt).

Cette race est peut-être une espèce différente, mais la sculpture, la pilosité et tous les autres détails se rapportent à la *P. fallax*. L'ouvrière est presque identique à celle de *fallax*. Par contre la *Ph. Jelskii* Mayr (Fourmi de Cayenne française) me paraît être identique à la variété de la *Ph. fallax* de St-Thomas que j'ai décrite dans les Mittheil. der Münch. entom. Vereins, 1881.