

distance de la base des antennes au bord postérieur de la tête. Ailes hyalines à nervures pâles. Testacée. Abdomen, dos du mésonotum et vertex plus ou moins brunâtres.

*Mâle.* Long., 4,3 mill. Testacé pâle avec la tête moins les mandibules et le chaperon d'un brun noirâtre; trois taches brun clair sur le mésonotum. Métanotum avec deux tubercules. Ailes comme la femelle.

Vineland en New Jersey (M. Morris).

**Pheidole Morrisii** n. sp. — *Soldat.* Long., 3,2 à 3,8 mill. Taille élancée. Tête relativement petite, plus petite que chez *pallidula* à laquelle elle ressemble à certains égards, presque aussi longue que large (sans les mandibules). Chaperon largement et faiblement évasé au milieu de son bord antérieur. Les scapes sont près d'atteindre le bord postérieur de la tête. Yeux bien plus gros et plus bombés que chez *pallidula*, situés en arrière du tiers antérieur de la tête. Cette dernière à côtés presque parallèles et à bord postérieur faiblement échancré. Une faible impression transversale sur le mésonotum. Métanotum allongé, muni de deux petites dents parfois à peine marquées; sa face basale est un peu convexe, un peu luisante, assez faiblement réticulée, de même que le reste du métanotum, les côtés du métasternum et les nœuds du pédicule. Côtés du pronotum ridés. La moitié antérieure de la tête est ridée longitudinalement, sauf le milieu du front et du chaperon qui sont lisses et luisants de même que tout le reste du corps. Pilosité dressée abondante partout, un peu oblique sur les tibias et les scapes. Couleur testacée avec la tête plus rougeâtre et l'extrémité de l'abdomen parfois un peu brunâtre.

*Ouvrière.* Long., 2,5 à 2,8 mill. Les scapes dépassent de moitié le bord postérieur de la tête. Tête rétrécie derrière. Yeux gros, situés presque au milieu des côtés de la tête. Impression du mésonotum très faible. Métanotum à face basale convexe, muni seulement de deux petits tubercules mousses. Pilosité, couleur et sculpture du soldat, sauf le pédicule et les côtés du pronotum qui sont lisses et luisants.

Vineland en New Jersey (M. Morris).

**Pheidole stulta** n. sp. — *Soldat.* Long., 6 mill. Tête, sans les mandibules longue de 2,3, large de 1,8 mill. — Stature de la *P. Guilelmi-Mülleri* Forel, et cependant bien distincte de cette espèce par sa tête plus plate, plus allongée, à côtés parallèles, ses scapes faiblement courbés vers leur base, non aplatis, son pronotum plus étroit, à peine tuberculé latéralement, son thorax sans aucune ride transversale, les épines non divergentes, plus longues et plus grêles de son métanotum, le nœud mince (squamiforme) du premier