

article de son pédicule (chez la *Guilelmi-Mülleri* ce nœud est épais), la pilosité dressée bien plus courte et moins grossière, brunâtre, de son corps et de ses pattes, enfin par sa couleur plus foncée, d'un brun rougeâtre avec l'abdomen plus terne, les pattes et les antennes plus claires. Les scapes n'atteignent pas la moitié de la distance de l'origine des antennes au bord postérieur de la tête. Thorax lisse et luisant sauf les côtés finement rugueux du mésothorax et du métathorax. Nœuds du pédicule finement réticulés-punctués, peu luisants. Sculpture de la tête et de l'abdomen comme chez la *P. Guilelmi-Mülleri*. Une impression longitudinale sur la face basale du métanotum. Chaperon caréné et échancré devant. Sillon frontal distinct.

Cette espèce me paraît fort rapprochée de *præusta* Roger, dont elle se distingue par la face basale lisse de son métanotum, sa taille plus petite, le premier nœud non échancré de son pédicule, par les épines bien plus longues de son métanotum, la sculpture différente du pédicule.

Caravellas, province de Bahia, Brésil (O. Joseph).

Pheidole Guilelmi-Mülleri Forel (Mittheil. der Schw. entom. Gesellsch., vol. VII, n° 5). — Je suis obligé de modifier la description du soldat comme suit. Les mots : « *Das Metanotum ist bei præusta glatt, bei unserer Art querverunzelt* » doivent être rayés et remplacés par les mots suivants : « *Das Pronotum hat stark vorragende Seitenecken (bei præusta schwach). Die Fühlerschaft ist nahe an der Basis mächtig und rasch gebogen, daselbst plattgedrückt. 1. Stielchenknoten dick, oben nicht ausgerundet.* »

Pheidole absurda n. sp. — *Soldat*. Long., 5 mill. Tête démesurément allongée, longue de 2,5 mill. (sans les mandibules) et large de 1,6 à 1,7, rectangulaire, aplatie, à côtés parallèles, à bord postérieur profondément incisé. Yeux petits, plats, situés vers le quart antérieur des côtés de la tête. Les scapes dépassent à peine le tiers de la distance de l'origine des antennes au bord postérieur de la tête. Chaperon sans carène, lisse et luisant, largement échancré au milieu de son bord antérieur, à côtés très courts. Arêtes frontales courtes. Sillon frontal profond, n'atteignant pas l'aire frontale. Mandibules courtes, obtuses, à peine croisées, à peine bidentées, lisses, luisantes, à ponctuation éparse. Tête lisse, luisante, à ponctuation assez espacée, mais régulière et fort distincte; plus serrée, plus forte et un peu allongée sur les joues où elle est entrecoupée de très fines stries longitudinales courtes. Côtés du front et fossette antennaire assez grossièrement ridés ou striés. Pronotum à proéminences latérales peu considérables, raminci en cou du côté de la tête. Mésonotum plat en dessus, sans impression transversale.