

atteignant le bord postérieur de l'occiput. Massue épaisse, de 3 articles, aussi longue que les 6 articles précédents du funicule réunis. Les antennes ont onze articles; les articles 2 à 4 du funicule sont au moins aussi épais que longs. Thorax médiocrement échancré; l'échancrure est assez étroite et la convexité du mésonotum faible, à peine plus élevée que le métanotum (comme chez les *Myrmica*). Face basale du métanotum faiblement convexe, presque horizontale, un peu plus longue que la face déclive, terminée par deux petites épines pointues, rapprochées, un peu divergentes, dirigées en haut et en arrière, à peine aussi longues que l'intervalle de leurs bases. Face déclive bordée de deux petites arêtes continuant les épines. Premier article du pédicule longuement pétiolé, muni devant, en dessous, d'une petite dent pointue, surmonté derrière d'un nœud conique arrondi. Second nœud aussi large derrière que long. Tibias et métatarses courts. Les cuisses postérieures sont d'au moins  $1/3$  plus longues que les tibias et fort atténuées à leur tiers basal.

Abdomen et face déclive du métanotum lisses et luisants, sauf quelques stries grossières très courtes à la base même de l'abdomen. Second nœud du pédicule finement et densément réticulé-punctué et presque mat. Premier article du pédicule et scapes finement et densément réticulés. Milieu de la tête assez grossièrement ridé ou ridé-strié en long; les rides divergent en arrière. Dos du thorax grossièrement et assez lâchement ridé en travers; côtés de la tête et du thorax irrégulièrement et grossièrement réticulés ou réticulés-ridés. Le fond des rides et des réticulations est partout irrégulièrement rugueux, ce qui rend la tête et le thorax subopaques. Pattes luisantes, éparsément ponctuées.

Pilosité dressée formée de soies raides et obtuses, jaunâtres, éparses sur tout le corps, nulles sur les tibias et les scapes qui n'ont qu'une pubescence subadjacente; corps presque sans pubescence.

D'un brun rougeâtre; pédicule plus roussâtre, abdomen plus brunâtre. Pattes d'un jaune brunâtre, mandibules d'un jaune roussâtre.

Rotorua (Nouvelle-Zélande), découverte par le Capt. Broun et reçue par M. H. Suter. Une seule ♂.

Cette intéressante forme vient ajouter une seconde espèce au genre *Huberia* que j'avais fondé il y a peu d'années sur la seule *H. striata* Smith (*Tetramorium striatum* Sm.). Bien distincte de l'*H. striata* par sa sculpture, sa taille, sa forme et sa pilosité, elle vient cependant confirmer les caractères génériques.