

Ponera antipodum nov. sp. — ♀. L. 3, 4 mill. Mandibules armées de six dents assez indistinctes. Tête distinctement plus large derrière que devant. Le sillon frontal assez faible derrière (devant l'ocelle antérieur). Œil plus distant du bord antérieur de la tête que la moitié de sa largeur (moins distant que le tiers de sa largeur chez la *P. punctatissima* ♀). Écaille un peu plus mince que chez la *P. punctatissima*; chacun des deux premiers segments de l'abdomen est presque aussi long ou aussi long que large. Noire; pattes, antennes et mandibules d'un roux jaunâtre; massue des antennes et milieu des scapes bruns. Du reste identique à la *P. punctatissima* ♀, dont elle est difficile à distinguer.

Voisine aussi de la *P. trigona* Mayr. — Rotorua (Nouvelle-Zélande), récoltée par le capitaine Broun.

c) AUSTRALIE, QUEENSLAND.

FOURMIS RÉCOLTÉES PAR M. GILBERT TURNER.

Camponotus Lownei nov. sp. = *C. NITIDUS* Lowne (nec Smith, nec Norton). — ♀ major L. 7,5 à 8 mill. Tête (sans les mandibules) longue de 2,0, large de 1,8 mill., presque carrée, un peu plus large derrière que devant, fortement échancrée derrière.

Mandibules courtes, obtuses, ponctuées, armées de 5 dents. Épistome sans lobe et presque sans carène, échancré au milieu et de chaque côté. Une impression transversale et courbée latéralement sur les joues. Devant de la tête faiblement subtronqué jusqu'aux articulations des antennes, comme chez le *Colobopsis truncata* ♀.

Thorax très court, très rapidement rétréci derrière, à dos peu convexe; suture méso-métanotale effacée. Face basale du métanotum très courte, étroite et fort convexe. Face déclive très haute, fort abrupte, subverticale. Écaille ovale, tranchante, subacuminée. Abdomen ovale.

Luisant, faiblement chagriné; côtés du thorax subopaques, plus fortement ridés ou ridés-réticulés.

De grosses fossettes éparses, piligères, sur le front, le vertex et le dos du thorax. Une ponctuation espacée régulière sur les joues. Le reste du corps presque sans ponctuation.

Pilosité jaunâtre, éparse, nulle sur les tibias et les tarses qui n'ont qu'une pubescence un peu soulevée. Pubescence très éparse et courte ailleurs.

Noir. Pattes et bord des segments abdominaux d'un jaune assez clair, un peu testacé. Antennes et tarses d'un jaune rougeâtre. Bord des mandibules rougeâtre foncé.