

♀ minor. L., 4,7 à 5 mill. Tête en trapèze, plus large derrière que devant. Yeux situés très en arrière. Épistome convexe, sans échancrure médiane. Suture méso-métanotale obsolète. Le métanotum entier tombe en formant une convexité assez forte; face basale aussi longue que la face déclive. Écaille plus épaisse, non acuminée, Pilosité notablement plus abondante et plus longue que chez la ♀ major; sur les tibias et les scapes, la pubescence passe à une pilosité oblique. Fossettes et points beaucoup plus épars et plus faibles que chez la ♀ major. Couleur un peu plus claire que chez la ♀ major; mandibules et bord antérieur de la tête d'un jaune brunâtre.

Mackay, Queensland, récolté par M. Gilbert Turner.

Cette espèce me paraît à n'en pas douter être identique au *C. nitidus* de Lowne.

Comme la *Formica nitida* de Smith est une *Colobopsis* (sous-genre de *Camponotus*), le nom postérieur de *Camponotus nitidus* Norton pour l'espèce mexicaine connue sous ce nom doit tomber et être remplacé par celui de *montivagus* Forel, appliqué à une race du Guatemala. Pour le type de Norton je propose le nom de race *rectithorax* n. st.

### **Polyrhachis Hookeri** Lowne,

r. **obscura** n. st. — ♀. L. 5,2 à 6 mill. Plus grande et surtout plus robuste que la forme typique. Dents du pronotum plus fortes. Épines du métanotum courtes (longues comme la moitié de l'intervalle de leurs bases), extrêmement larges (aussi larges vers leur base que la moitié de leur longueur), un peu aplaties, mais assez pointues à l'extrémité. Épines de l'écaille courtes, un peu plus courtes que l'intervalle de leurs bases (beaucoup plus longues chez la *Hookeri*). Pilosité brune encore plus épaisse, plus sétiforme, plus longue et plus obtuse que chez la forme typique et un peu plus abondante.

Une pubescence d'un rouge doré foncé, très courte et diluée, donne un léger reflet rougeâtre au thorax et à la tête. Pubescence de l'abdomen comme chez la *Hookeri* i. sp. Tête et thorax noirs, sans reflet métallique (d'un vert bleuâtre métallique splendide chez la forme typique). Bords du thorax et épines luisants; le reste mat ou subopaque. Sculpture, forme, pilosité et couleur du reste identiques à la *P. Hookeri* typique dont elle se rapproche plus que la race suivante.

Mackay, Queensland, récoltée par M. Gilbert Turner.

r. **Lownei** n. st. — ♀. L. 4,8 à 5,3 millim., comme la *P. Hookeri*, i. sp., dont elle diffère par les caractères suivants:

Tête un peu plus allongée. Angles antérieurs du pronotum