

prolongés en une dent aiguë ou épine très courte, plus longue que large. Suture méso-métanotale entièrement obsolète. Épines du métanotum plus longues, plus fortes, beaucoup moins divergentes, distinctement courbées en dedans, au moins aussi longues que la face basale du métanotum et le mésonotum réunis. Sculpture de la tête et du thorax moins vermiculée, plus réticulée-punctuée, bien plus mate. Abdomen densément et fortement ridé-réticulé, avec un éclat soyeux dû à la sculpture (assez superficiellement réticulé, sans éclat soyeux chez *Hookeri* i. sp.). Sur l'abdomen, la *P. Hookeri* i. sp. a une bande longitudinale médiane brune, atténuée devant et derrière, et formée par une forte pubescence brune; cette bande est deux fois plus large que l'espace qui la sépare du bord de l'abdomen; ce dernier est couvert d'une forte pubescence grisâtre, un peu dorée sur les bords de la bande médiane brune. Chez la *P. Lownei*, la bande pubescente médiane, brune est beaucoup plus étroite, à peine la moitié aussi large que l'espace qui la sépare du bord de l'abdomen; ce dernier est entièrement dépourvu de pubescence et d'un beau vert bleuâtre métallique foncé (noirâtre chez la *P. Hookeri* i. sp.). La tête et le thorax sont au contraire noirs et assez mats chez la *P. Lownei*, tandis qu'ils sont d'un vert doré bleuâtre métallique et assez luisants chez la *P. Hookeri*.

Du reste comme la *Hookeri* i. sp. — Mackay, Queensland (M. Gilbert Turner).

**Polyrhachis Turneri** nov. sp. — ♀. L. 5 à 5,5 mill. Groupe *ornata*, *Daemeli*, etc. Mandibules densément striées, mates, avec 5 dents. Épistome caréné, sans dents, avec un lobe trapézoïdiforme. Arêtes frontales sinueuses, rapprochées, plus de deux fois plus longues que distantes l'une de l'autre. Tête en trapèze, élargie derrière. Yeux proéminents. Les scapes dépassent l'occiput de plus de la moitié de leur longueur.

Thorax armé de 4 épines et d'un bord aigu tout le long de ses côtés. Les épines pronotales sont longues, aiguës, très divergentes, horizontales, un peu convexes en dessus. Pronotum convexe, rectangulaire, plus large que long. Suture pro-mésonotale profondément imprimée, formant une échancrure du dos du thorax et une profonde échancrure de son bord. Le mésonotum forme un plan faiblement incliné d'arrière en avant et la face basale du métanotum, qui est beaucoup plus large que longue, un plan incliné d'avant en arrière. Entre les deux, la suture méso-métanotale forme l'arête d'un toit très plat.

Le thorax a donc deux convexités, une devant, l'autre derrière l'échancrure pro-mésonotale. Épines métanotales très longues et