

pronotum; vue de côté, l'écaille est subconique, presque tranchante et un peu concave au sommet, convexe devant et derrière, surmontée à ses angles supérieurs de deux épines horizontales, courtes, fortement courbées en arrière, embrassant l'abdomen. Abdomen ovale, allongé, grand. Pattes assez longues. Face interne des tibias avec une rangée de petits piquants.

Finement réticulée-ridée ou réticulée-punctuée et mate ou subopaque. Abdomen et pattes plus faiblement réticulés et subopaque ou luisants.

Pilosité dressée, jaunâtre, courte, éparse sur tout le corps, nulle sur les tibias et les scapes. Tout le corps, les pattes et les antennes couverts d'une pubescence grisâtre, fine, un peu soyeuse, formant un duvet fin, surtout abondant sur l'abdomen où il est un peu doré et sur le dos du thorax, mais ne cachant nulle part absolument la sculpture. La pubescence est plus fine, plus délicate que chez le *P. dives*.

Entièrement noire.

Mackay, Queensland (M. Gilbert Turner).

Polyrhachis Heinlethii nov. sp. ♀ — L. 3,6 à 4,5 mill. Groupe *Guerini*. Mandibules armées de 5 dents, assez luisantes, ponctuées vers l'extrémité, striées à la base. Épistome caréné, avec un fort lobe trapézoïdiforme, dont le bord antérieur, presque concave, n'a pas de dents distinctes. Tête élargie et convexe derrière, un peu plus longue que large, à côtés peu convexes, arêtes frontales à peine plus longues que distantes l'une de l'autre, fort peu divergentes, à peine sinueuses. Les scapes dépassent l'occiput d'un tiers de leur longueur. Yeux gros, convexes. Dos du thorax à bord aigu, convexe d'avant en arrière et de droite à gauche. Suture promésototale distincte; suture méso-métanotale oblitérée. Thorax peu rétréci en arrière. Dents du pronotum étroites, aiguës, un peu plus longues que larges. Bord du thorax incisé derrière le pronotum et pourvu de chaque côté de deux dents au mésonotum et d'une dent au métanotum. Le mésonotum et la face basale du métanotum réunis sont un peu plus larges que longs. Les épines du métanotum sont plutôt courtes, horizontales, larges, fortement courbées en dedans après avoir très fortement divergé; elles forment à peu près un quart de cercle.

Écaille presque tranchante et élargie au sommet, avec deux longues épines presque horizontales, entourant la base de l'abdomen à ses angles supérieurs; elles sont fortement courbées en dedans près de leur base, presque droites sur leur seconde moitié. En outre une épine droite, verticale, impaire, plus courte, au milieu de son bord supérieur. Cette écaille est d'un type intermédiaire entre celles des *P. Guerini* et *thrinax*.

Abdomen sphérique. Cuisses un peu renflées vers leur base.