

Tout le corps, les pattes et les antennes couverts d'une pilosité jaunâtre de longueur médiocre, pointue, assez fine, assez abondante. Pubescence presque nulle.

D'un rouge un peu brunâtre ou jaunâtre. Abdomen, sauf le premier segment, noirâtre, avec le bord des segments jaunâtre. Pattes et antennes d'un brun foncé. Tarses, front et vertex d'un brun rougeâtre.

Ceylan (Nietner), Musée de Berlin.

e) FOURMIS DE L'ILE DE LA RÉUNION

RÉCOLTÉS PAR M. LE D^r JACOB DE CORDEMOY PAR L'ENTREMISE OBLIGEANTE DE M. LE D^r CHRIST A BÂLE.

1. *Prenolepis bourbonica* Forel ♀. — Variété plus claire, d'un brun roussâtre (espèce de l'Inde, avec race de la Réunion). Seulement la forme de l'Inde (*r. bengalensis* For.) ayant été décrite ultérieurement à celle de la Réunion, c'est cette dernière qui porte le nom de l'espèce.

2. *Prenolepis longicornis* Latr. ♀. — Cosmopolite.

3. *Brachymyrmex patagonicus* Mayr., var. *Cordemoyi* n. var. — Un peu plus poilu que le type dont je ne puis du reste le distinguer. Il est fort curieux de trouver un *Brachymyrmex*, genre exclusivement néotropical, à la Réunion. Il est donc très probable qu'il s'agit d'une importation récente par les vaisseaux.

4. *Plagiolepis Alluaudi* Emery. — Identique à celle des Seychelles.

5. *Plagiolepis longipes* Jerdon ♀. — Espèce de l'Inde, importée de Cochinchine depuis quelques années seulement; d'après M. Vinson de S^t Denys, cette espèce a infesté l'île entière et détruit la faune locale.

6. *Technomyrmex albipes* Sm. — Forme de l'Inde et de Madagascar.

7. *Tapinoma melanocephalum* Fab. — Cosmopolite.

8. *Leptogenys maxillosa* Sm., var. *Vinsonella* Dufour. — Cette variété qui m'a été envoyée d'abord par M. Vinson fait plus ou moins passage de la *maxillosa* Sm. d'Afrique à la *falcigera* Rog. de l'Inde et de Madagascar.

9. *Monomorium floricola* Jerdon — Cosmopolite.

10. *Pheidole megacephala* F., *r. picata* Forel (forme malgache).

Somme toute, sur dix espèces, trois espèces cosmopolites, cinq formes importées de l'Inde ou de Madagascar (dont l'une constitue une race qui paraît propre à la Réunion, mais diffère bien peu de la forme de l'Inde), une espèce importée d'Amérique et une seule espèce paraissant propre à la Faune de la Réunion et des Seychelles.