

courbés et squamiformes est dispersée sur tout le corps. Les quatre derniers articles des antennes légèrement plus épais que les autres. Yeux très petits. Mandibules fort épaissies au bout.

Bhamó, Birmanie (Fea).

3me Genre AMBLYOPONE, Erichson.

Subgen. *Stigmatomma*, Roger.

Je ne puis trouver les caractères indiqués par M. Emery (deux rangées de dents aux mandibules ; tête mate et densément ponctuée) comme suffisants pour rétablir le genre *Stigmatomma*. La *S. Emeryi*, Saunders, du Maroc a la tête luisante, et les dents des mandibules sont très variables. Les espèces connues de l'Inde appartiennent toutes au S. G. *Stigmatomma*, ayant deux rangées de dents aux mandibules.

Tableau des ouvrières.

- Yeux ayant plus de 100 facettes. L. 8 mill *A. Rothneyi* nov. sp.
 Yeux ayant de 35 à 40 facettes..... 1
 1. L. 8, 3 mill. Sculpture plus grossière. Pédicule mat. Angles
 antérieurs de la tête non proéminents *A. Bellii*, nov. sp.
 L. 6 à 6,5 mill. Pédicule luisant. Sculpture moins grossière.
 Angles antérieurs de la tête proéminents *A. Fea*—Emery.

Liste des espèces du genre *Amblyopone*.

1. *A. (Stigmatomma) Bellii*, nov. spec.

♀. L. 8, 3 mill. Mandibules obliquement striées, terminées par une dent lisse très recourbée et très longue. Sur la moitié terminale de leur bord interne une double rangée de 5 à 6 dents recourbées en arrière. Vers la base des dents obtuses. Tête presque carrée, aussi large que longue, à côtés fort convexes, avec les angles antérieurs à peine marqués. Palpes de 2 et 3 articles. Deux dents proéminentes, une de chaque côté du dessous du bord antérieur de la tête. Bord antérieur de l'épistome sans dentelures, droit, mais imprimé derrière. Aire frontale très étroite, élevée. Les yeux, situés en arrière du milieu des côtés de la tête, ont de 35 à 40 facettes. Les scapes dépassent à peine les 3/5 de la distance de leur racine au bord occipital. Ce dernier un peu concave. Funicules lentement épaissis vers l'extrémité ; avant dernier article plus large que long, ceux de la base plus longs que larges, les autres aussi longs que larges.

Mésnotum petit et court, mais fort distinct, et non recouvert par le pronotum. Suture méso-métanotale peu distincte. Le thorax fortement rétréci au mésnotum. Face déclive du métanotum obliquement tronquée ; les côtés obtusément bordés ; en haut, elle n'est nullement bordée. Le noeud du pédicule est distinctement transversal, légèrement plus large que long.

Tête, thorax et pédicule mats, densément, irrégulièrement et assez grossièrement réticulés ridés, avec de fines stries courtes et parfois de fines réticulations au fond. Souvent un point piligère au fond des réticulations. Sur le