

pédicule et les côtés du thorax, les réticulations s'espacent et forment de grosses fossettes espacées à point piligère au milieu. Premier segment abdominal (après le pédicule) mat devant, assez densément et irrégulièrement ponctué ou réticulé-ponctué; les autres lisses, luisants, à points piligères. Scapes densément ponctués, subopaques. Jambes luisantes, abondamment ponctuées. Epistome strié en long.

Pilosité dressée courte, fine, roussâtre, assez abondante partout, plutôt oblique sur les tibias et sur les scapes. Pubescence fine, roussâtre, assez abondante partout, sans former nulle part de duvet.

Noire. Pattes, antennes, mandibules et extrémité de l'abdomen brunes. Extrémité des tarsi et des mandibules roussâtre.

Kanara (Bell).

2. *A. (Stigmatomma) Rothneyi*, nov. spec.

♂. L. 8, 0 mill. Mandibules et antennes comme chez la *Bellii*, mais les scapes sont un peu plus longs et les funicules un peu plus grêles, moins épaissis vers l'extrémité. Tête rectangulaire, plus longue que large, à côtés moins convexes, avec les angles antérieurs marqués, subdentiformes. Bord occipital plus tranché, concave. Yeux plats, grands, ayant de 100 à 120 facettes, situés aux 3/5 postérieurs des côtés de la tête. Le bord antérieur de l'épistome est légèrement convexe et très indistinctement crénelé, imprimé derrière.

Thorax comme chez la *Bellii*, mais la face déclive, tronquée du métanotum est distinctement bordée latéralement et subbordée en haut, sauf au milieu. Vu de dessus, le pédicule est plus rétréci derrière et aussi long que large ou même légèrement plus long.

Epistome strié en long. Tête mate, densément et assez finement réticulée-ridée, avec des fossettes espacées plus grossières portant un point piligère au milieu. Thorax et pédicule subopaques, densément ponctués ou réticulés-ponctués, un peu luisants dessus. Abdomen luisant, avec des points piligères épars, un peu plus abondants sur le 1er segment. Scapes et pattes ponctués.

Pilosité et pubescence comme chez la *Bellii*, mais jaunâtres, un peu plus fines et un peu plus longues. Plus de poils aux tibias et aux scapes.

D'un brun noirâtre. Tous les bords articulaires ou suturaux du corps d'un brun roussâtre. Pattes, antennes, mandibules, lobe des arêtes frontales et extrémité de l'abdomen d'un rougeâtre terne.

Barrackpore (Rothney).

Cette espèce se distingue surtout par ses grands yeux.

*A. (Stigmatomma) Fea*, Emery.

♂. Antennes à funicule à peine renflé. Angles antérieurs de la tête proéminents. Bord antérieur de l'épistome muni de 7 à 9 denticules. D'un brun foncé; tête et thorax mats, la première grossièrement réticulée, le second densément ponctué. Abdomen ponctué, assez luisant.