

- mill. Bord interne des mandibules avec 2 denticules... *A. Niet-neri*—Roger.
- Pédicule atténué au sommet, mais sans cône. Bord interne des mandibules avec 10 à 13 forts denticules. L. 7 à 7, 5 mill. (à 8 d'ap. Emery). Tibias et scapes plus poilus que chez le *Risii* ..... *A. princeps*—Emery.
2. Pédicule conique, élevé, prolongé en dent ou épine mousse. Bord interne des mandibules très faiblement denticulé. Dent subapicale des mandibules très petite et située très près de l'extrémité de la dent inférieure..... *A. Risii*, nov. spec.
- Pédicule squamiforme, sans trace de cône. Métanotum bidenté. Epistome convexe devant, non échancré. Yeux éloignés de la fossette antennaire. D'un jaune rougeâtre. L. 4, 8 à 4, 9 mill. .... *A. longifossatus*—Mayr.
- Comme le précédent, mais les yeux très petits (20 facettes) et la tête fortement ponctuée..... *A. myops*—Emery.
- Pédicule squamiforme sans trace de cône. Métanotum inerme. 3
3. Premier segment de l'abdomen (après le pédicule) entièrement lisse et luisant jusqu'à sa base, sauf les fins points piligères ordinaires dispersés ..... 4
- Premier segment de l'abdomen ayant au moins à sa base de gros points enfoncés, rapprochés, qui sont un peu en fossettes et lui donnent un aspect inégalement sculpté..... 5
4. L. 5, 5 à 5, 8 mill. Ecaille assez épaisse, presque aussi épaisse au sommet qu'à la base. Côtés de la tête jaunâtre avec une grande tache brune dans la fossette qui sépare l'œil de l'angle occipital ..... *A. Madarászii*—Mayr.
- L. 6 à 6, 5 mill. Ecaille très épaisse, allant en s'épaississant du sommet à la base ce qui lui donne un aspect légèrement conique de côté. Tête d'un rouge jaunâtre uniforme comme le thorax ; abdomen brun. *A. Sedilloti*—Emery, var. *indicus*, nov. var.
5. Yeux grands, un peu plus larges que la partie élargie des mandibules ..... 6
- Yeux plus petits, plus étroits que la partie élargie des mandibules. Ecaille mince..... 7. *A. punctiventris*—Mayr, et ses races.
6. L. 7 mill. Tête, thorax, pédicule et premier segment de l'abdomen fortement sculptés et mats. Ecaille fort épaisse. *A. orientalis*—André, et var. *kanariensis*, nov. var.
- L. 4, 5 mill. Côtés de la tête, occiput, vertex et écaille (sauf quelques fines stries sur les côtés de cette dernière) lisses et luisants. Ecaille mince ..... *A. Yerburyi*, nov. sp.
7. L. 3, 6 à 3, 8 mill. Thorax densément ponctué ou réticulé-ponctué et subopaque, ridé transversalement sur la face