

- déclive du métanotum. Abdomen luisant. Base du premier segment avec de gros points enfoncés nombreux. D'un rouge jaunâtre. Pattes, antennes et mandibules testacées, abdomen brunâtre ..... *A. punctiventris*, i. sp., Mayr.
- [L. 3, 8 à 4 mill. Un peu plus grêle; métanotum plus étroit, à face déclive un peu concave et bordée. Ecaille un peu plus épaisse au sommet. Sculpture plus forte. Thorax, densément réticulé-punctué et mat. Couleur plus foncée. Nouvelle Guinée ..... *A. punctiventris*, r. *oceanicus*—Emery.]
- L. 4 à 4, 5 mill. Plus robuste que la race *oceanicus*. Métanotum plus large et moins bordé. Ecaille plus large, plus épaisse en bas et plus mince en haut, où elle est un peu courbée en avant. Sculpture du thorax très dense et très grossière; sur le pronotum, devant, les réticulations sont entremêlées de rides arquées, concaves en arrière (c'est aussi le cas chez l'*oceanicus*). Les yeux sont situés sensiblement en avant du milieu des côtés de la tête; chez l'*oceanicus* à peine ..... *A. punctiventris*, r. *Taylori*, nov. st.
- L. 4, 8 à 5, 2 mill. Encore plus robuste, thorax plus large, métanotum bordé ..... *A. punctiventris*, r. *rudis*, Emery.

Liste des espèces du Genre *Anopheletus*.

1. *A. Nietneri*, Roger.  
Ceylan (Nietner).
2. *A. princeps*, Emery.  
Tcibodas, Java (Beccari); Thagata, Tenasserim (Foa).
3. *A. Risii*, nov. spec.

♀ (voir tableau). Voisine du *princeps*, cette belle espèce en diffère encore par l'extrémité très proéminente du bord interne des mandibules (avant les dents apicales) : cette extrémité porte une forte dent courbée, dirigée en avant et en dedans. En outre les yeux sont plus grands, l'occiput est moins profondément excavé et le mésonotum faiblement convexe, sans arête (chez le *princeps* il a devant une arête transversale élevée). Pilosité dressée assez épaisse sur le corps, les pattes et les scapes. Front strié en long; métanotum grossièrement ridé en travers; quelques vagues rides sur le dos du mésonotum et le cou du pronotum. Tout le reste lisse et luisant. D'un rouge un peu brunâtre; abdomen d'un jaune brunâtre; pattes, antennes et mandibules testacées. Mandibules longues comme les  $\frac{2}{3}$  de la tête.

Récolté par le Dr. F. Ris au Victoria Pic, près de Hong Kong; nid sous une pierre.

4. *A. myops*, Emery.

Palon, Birmanie (Foa).

C'est avec doute que j'ai intercalé dans le tableau cette espèce qui n'est inconnue en nature. Mayr n'en parle pas dans la description si détaillée de