

son *longifossatus*, et Emery ne parle pas des caractères de l'épistome, des fossettes antennaires et des arêtes frontales qui distinguent le *longifossatus*. Les différences des yeux et de la sculpture que j'ai cru pouvoir tirer des descriptions sont peu sûrs.

5. *A. longifossatus*, Mayr.

Filawewa, Ceylan (Madarász).

6. *A. Madarászi*, Mayr.

♂. L. 4 mill. ; longueur d'une antenne 3, 5 mill., d'une aile aussi 3, 5 mill. Mandibules rudimentaires, sans dents, formant un petit triangle dont la pointe est dirigée droit en avant, et qui ne peuvent se croiser au milieu, étant trop courtes. Premier article du funicule globuleux. Les yeux occupent à peu près tout le côté de la tête. Bord postérieur de la tête droit. Thorax robuste, plus large que la tête, avec deux sillons convergents au mésonotum et un scutellum proéminent. Métanotum formant une seule convexité médiocre. Le pédicule forme, vu de côté, un petit cône bas et obtus. Valvules génitales extérieures longues et étroites.

Tête et thorax fortement ponctués et subopaques ; métanotum rugueux. Abdomen et pédicule luisants, à points piligères. Pilosité courte et médiocre ; pattes et scapes sans poils dressés. D'un noir un peu brunâtre sur les côtés du thorax. Abdomen brun, avec le bord des segments jaunâtre. Pattes et antennes d'un jaune brunâtre sale. Ailes hyalines, finement pubescentes.

Orissa (Taylor), Kanara, ♀ ♂ (Bell), Kalawewa, Ceylan (Madarász).

7. *A. Sedilloti*, Emery.

Tunisie, près de Gabès (Sédillot).

Var. *indicus* nov. var. ♀. Un peu plus grand que le type (6, 2 à 6, 5 mill.). Suture méso-métanotale plus obsolète que chez le type. Un peu moins pubescent que le *Sedilloti* de Tunisie, et de couleur un peu plus claire. La sculpture de la tête, en particulier la ponctuation, est aussi encore un peu plus faible. L'écaille est un peu moins amincie en haut (moins en cône, vue de côté). Toutes ces différences sont trop faibles pour constituer autre chose qu'une variété locale.

♀. L. 7 mill. Ocelles très petits. Pronotum plus long que le mésonotum. Ce dernier petit, presque plan, bordé de deux carènes qui convergent en arrière. Métanotum subcubique, ridé en travers. Pronotum en partie strié et ponctué ; mésonotum mat irrégulièrement ponctué. Ailes subhyalines. Du reste comme l'ouvrière.

♂. L. 4, 5 à 5 mill. Tout à fait semblable au ♂ du *Madarászi*, mais le mésonotum n'a pas de sillons convergents. Pédicule un peu plus haut. Valvules génitales plus grosses. D'un noir brunâtre ; derrière de l'abdomen brun. Pattes et antennes testacés. Les ailes hyalines et glabres ont les nervures et la tache marginale assez pâles ; elles ont deux cellules cubitales