

et une cellule radiale fermée (ce qui n'est pas visible sur les exemplaires à ailes chiffonnées du *Madarácsi*).

Bombay, Poona ♀, ♀ (Wroughton), Coonoor (Daly), Guzerath (Wroughton), Bhavnagar et Vehar Lake, près de Bombay (Rothney), Ahmednagar, ♀, ♀, ♂ (Pater Heim), Karwar, Kanara (Aitken).

8. *A. orientalis*, André.

Cochinchine (d'après André).

R. A. kanariensis, nov. st.

♀. L. 6 à 6,7 mill. Tête, thorax et pédicule entièrement mats (peu luisants chez l'*orientalis*). Une pilosité dressée d'un jaune roussâtre abondamment et également répartie sur tout le corps, les antennes et les pattes (chez l'*orientalis* elle est blanchâtre, très oblique et presque nulle sur la tête et l'extrémité de l'abdomen). Tête densément striée-ridée ; les stries divergent en arrière et leur intervalle est réticulé-punctué. Thorax densément, fortement et irrégulièrement réticulé rugueux ainsi que le pédicule et les $\frac{2}{3}$ antérieurs du 1er segment abdominal. Quelques rides en outre sur la face déclive et les côtés du métanotum. Le tiers postérieur du 1er segment abdominal est strié en long chez certains exemplaires (Kanara), plutôt punctué et luisant chez d'autres (Madras). Le reste de l'abdomen est lisse, luisant et punctué. Chez l'*orientalis* typique le thorax (sauf le pronotum rugueux) est ridé. L'écaille, fort épaisse, aussi épaisse en haut qu'en bas, est légèrement, mais distinctement avancée (acuminée) à son bord supérieur antérieur ; la pointe mousse que forme ainsi ce bord est dirigée en avant. (André n'indique rien de semblable pour l'*orientalis*).

D'un brun noirâtre ; mandibules, antennes, pattes, joues, épistome et arêtes frontales rougeâtres. Hanches et cuisses brunes chez les exemplaires de Madras. Chez les exemplaires de Kanara, le thorax, l'écaille, les hanches et les cuisses sont rougeâtres.

Les exemplaires de Madras constituent une variété (*obscurior*) un peu différente et plus grande (6,5 à 6,7 mill.), tandis que ceux de Kanara n'ont guère plus de 6 mill.

Kanara (Wroughton) ; Madras (Rothney, var. *obscurior*).

9. *A. Yerburyi*, nov. sp.

♀. Ressemble beaucoup à la race *Taylori* du *punctiventris*, mais en diffère par ses grands yeux, sa taille un peu plus svelte et sa sculpture plus faible. Chez le *Taylori* les articles 3 à 6 du funicules sont à peine plus longs que larges, chez le *Yerburyi* $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges. Les scapes atteignent ou dépassent un peu le bord occipital. Le thorax est rugueux (irrégulièrement réticulé), avec quelques rides concaves en arrière, devant le pronotum ; métanotum ridé en travers. Ecaille mince, lisse et luisante, base du 1er segment abdominal avec de gros points ou fossettes abondantes, mais lisse dans leurs intervalles. Sur le corps une pilosité courte, médiocrement