

abondante, d'un jaune roussâtre. Tibias et scapes sans poils dressés. Mandibules longues comme un peu plus de la moitié de la tête, sans dentelures à leur bord interne. Dent subapicale moyenne. D'un brun de poix ; thorax parfois d'un brun roussâtre. Tête d'un jaune rougeâtre. Antennes, mandibules et pattes testacées.

Ceylan (Yerbury, Madarász).

10. *A. punctiventris*, i. sp., Mayr.

♀. L. 4 mill. Thorax large. Pronotum aussi long que le mésonotum ; tous deux luisants et abondamment ponctués. Le mésonotum a deux carènes latérales convergeant en arrière. Scutellum lisse et luisant. Métanotum fortement ridé en travers. Ecaille échancrée au sommet. Ailes manquent.

Calcutta et Nuddea District (Rothney), Calicut (Rothney), Orissa ♀ (Taylor), Barrackpore (Rothney), et Ahmednagar (Pater Heim).

Race. *A. Taylora*, nov! st.

♀. Forme un passage entre le *punctiventris* et en particulier sa race *oceanicus* de Nouvelle Guinée et le *rudis*. La couleur varie du brun foncé au rouge jaunâtre ou brunâtre. Les pattes, les antennes et les mandibules demeurant d'un jaune sale. Bord interne des mandibules inerme, tranchant. Taille et aspect du *Yerburyi*, la tête étant ordinairement plus claire, comme chez ce dernier. Ecaille souvent un peu échancrée au sommet. Voir du reste le tableau.

Coonoor (exemplaires foncés), Belgaum et Poona (exemplaires clairs), récolté aux trois endroits par M. Wroughton.

Race. *A. rudis*, Emery.

M. Emery a déjà soupçonné avec raison que cette forme pourrait n'être qu'une race du *punctiventris*. Le fait est maintenant hors de doute, le *Taylora* constituant le passage.

Mandalay, Birmanie (Fea).

3^{me} TRIBU HARPEGNATHII.

6^{me} Genre HARPEGNATHOS, Jerdon.

= *Drepanognathus*, Smith.

Tableau des ouvrières.

- L. 18 mill. Tête et abdomen noirâtres. Thorax et pattes roussâtres (d'après Jerdon) *H. saltator*—Jerdon.
- L. 16 à 18 mill. Entièrement d'un noir brunâtre, avec les mandibules, l'épistome (sauf une tache brune au milieu), les arêtes frontales, les funicules, les deux extrémités des scapes, les segments postérieurs de l'abdomen, les pattes (sauf une bande ou ligne brune longitudinale de chaque côté des cuisses et des tibias) d'un testacé plus ou moins jaunâtre ou rougeâtre. Abdomen mat, densément et très finement réticulé-ponctué. Sur son 1er segment, en outre, de grosses fossettes allongées. Articles 3 à 7 du funicule moins de 3 fois plus longs que larges..... *H. venator*—Smith,