

pubescence. Le 1er segment de l'abdomen proprement dit est pyriforme et forme presque comme, un 2me noeud de pédicule ; l'abdomen est un peu resserré après le segment suivant ! Pris avec les ♂ et la ♀.

Thorax et pédicule d'un noir brunâtre. Tête et 1er segment pyriforme de l'abdomen proprement dit d'un rouge jaunâtre. Reste de l'abdomen d'un jaune un peu rougeâtre. Pattes et antennes d'un testacé très pâle.

Dehra Dun, ♂, ♀ (Smythies), Khasia Hills, Assam, ♂, ♀ (Smythies), Assam (Lindgren), Madras (d'après Smith).

Var. *rugosus*, Mayr. Mayr a décrit sous le nom de *H. rugosus* une ♀ sans ailes de Hong Kong dont la description correspond à tous égards, même dans les plus fins détails de couleur, aux ♀ d'*H. venator* que je possède, mais le premier segment de l'abdomen a des rugosités au lieu de fossettes allongées. Comme ces deux genres de sculpture passent souvent de l'un à l'autre en cet endroit, je considère le *H. rugosus* comme simple variété du *H. venator*.

3. *H. cruentatus*, Smith.

♀. Diffère de la ♀ du *venator* par les mêmes caractères que l'ouvrière (voir tableau). L. 17 mill. Ailes manquent. Thorax comme chez le *venator* ♀. Une ♀ de Ceylan a une tache ferrugineuse sur le 1er segment de l'abdomen proprement dit. L'autre de Travancore est au contraire plus foncée.

♂. (caractères génériques, voir *venator* ♂). L. ♀, 5 mill. Mandibules très courtes, rudimentaires, en triangle assez large, sans pointe prolongée. Tête aussi longue que large, fortement rétrécie derrière les yeux et allant en se rétrécissant jusqu'à l'articulation occipitale. Concavité devant le scutellum plus courte et plus large que chez le *venator*. Face déclive du métanotum fortement bordée d'une arête (faiblement chez *venator*). Premier segment de l'abdomen proprement dit après le pédicule, pyriforme, allongé, comme chez le *venator*, mais pas de rétrécissement après le segment suivant. Une petite carène médiane derrière l'occiput.

Lisse et luisant. Métanotum, pédicule (à noeud allongé comme chez le *venator* et l'ouvrière) et une partie des côtés du mésanotum grossièrement rugueux (réticulés ou ponctués). Quelques fossettes ou rides vagues et éparses sur le reste du thorax. Pilosité comme chez le *venator*. D'un roux brunâtre ; pédicule plus foncé. Abdomen brun. Pattes et antennes d'un testacé très pâle. Ailes hyalines à nervures et tache marginale fort pâles.

Poona (Wroughton), Kanara (Bell, avec une araignée mimétique, le *Salticus plataloides*, Cambr.), Travancore (Ferguson), Ceylan, ♂ (Yerbury), Ceylan ♀ (Sarrasins frères), Hong Kong (d'après Smith).

Je ne crois pas faire erreur en rapportant ce ♂ au *cruentatus*. Je doute par contre de la patrie " Hong Kong " indiquée par Smith qui indique tout à côté Madras pour le *venator*. Tous les *venator* que j'ai reçus venaient du nord et des régions montagneuses et tous les *cruentatus* du sud et de l'ouest. Smith n'aurait-il pas transposé la patrie des deux espèces ?

(To be continued.)