

FOURMIS TERMITOPHAGES, LESTOBIOSE,
ATTA TARDIGRADA, SOUS-GENRES D'EUPONERA

par Aug. Forel.

(1901) b / 1901M

Ph.

Monomorium Heyeri n. sp. — Espèce dimorphe, dont l'ouvrière major ressemble à une *Pheidole*, mais présente des passages à la minor.

♂ major. — Long 4,0 à 4,2 mill. — Mandibules épaisses, lisses, luisantes, à points épars, quelques stries éparses vers l'extrémité et environ quatre dents. Épistome peu convexe, sans dents ni carènes, mais faiblement échancré au milieu de son bord antérieur, légèrement imprimé derrière l'échancrure et peu ou à peine convexe, sur sa portion médiane, ce qui dénote une apparence des deux carènes qu'offrent les autres espèces. Tête grande, carrée, aussi large que longue, faiblement rétrécie devant, faiblement concave derrière, semblable à celle d'un ♂ de *Pheidole*, avec un sillon occipital faible, mais assez distinct, se perdant sur le vertex. Aire frontale triangulaire. Une fossette médiane sur le devant du vertex (place de l'ocelle antérieur). Situés un peu en avant du milieu des côtés, les yeux sont fort petits, plats, composés d'une douzaine de facettes en partie atrophiées. Antennes courtes, de 11 articles; massue de trois, à peu près aussi longue que le reste du funicule, épaisse, avec le dernier article au moins aussi long que les deux précédents réunis; les autres articles, sauf le premier, plus épais que longs. Arêtes frontales courtes; sillon frontal court et peu distinct.

Suture pro-mésonotale presque obsolète; pronotum large, robuste, subépaulé. Suture méso-métanotale profondément imprimée, mais sans former d'échancrure proprement dite, formant seulement une courte interruption du dos du thorax qui est peu convexe et à peine plus haut devant qu'à la face basale du métanotum. Cette dernière légèrement plus longue que la face déclive à laquelle elle passe insensiblement par deux faibles bosses longitudinales laissant entre elles une concavité ou gouttière longitudinale évasée. Premier nœud du pédicule pétiolé devant et brusquement surmonté derrière d'un nœud squamiforme large, à bord supérieur droit, moins haut et plus large que celui du *Latastei*, moins épais et plus large que chez *Pamblyops*. Second nœud transversal, plus ou moins rectangulaire, mais arrondi et moins large aux angles antérieurs, beaucoup plus large que long. Pattes plutôt courtes.

Lisse et très luisant, avec une ponctuation piligère éparse, fine, souvent brunâtre. Fossettes antennaires, arêtes frontales et côtés de l'épistome striés en long ou un peu obliquement. Côtés du mésonotum réticulés-ponctués et plus ou moins mats.