

Une pilosité dressée, jaunâtre, assez fine, est assez également répartie partout, assez oblique sur les tibias et les antennes, où elle est plus courte et un peu plus abondante. Pubescence presque nulle.

Entièrement d'un jaune pâle, très pâle même sur l'abdomen. Les mandibules et les côtés de l'épistome d'un brun roussâtre. Articulations des membres légèrement brunies.

♂ minor. — Long. 2,7 à 2,9 mill. — Comme la major, mais la tête, quoique grande, carrée et au moins aussi large que longue, est beaucoup plus petite, sans sillon occipital, à peine concave derrière. Sans être bicaréné, l'épistome présente cependant une apparence des deux carènes du genre. Les yeux n'ont que 4 à 6 facettes. Premier nœud du pédicule un peu plus épais et moins large. Du reste, comme l'ouvrière major, mais les côtés du mésonotum sont subopaques, plus faiblement réticulés, et la couleur encore plus pâle. — Une ♀ média est intermédiaire (3,3 mill.).

S'-Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brésil, vivant seulement chez les termites, où il a été découvert par M. Heyer. Reçu de M. Wasmann.

Voisin du *M. amblyops* Emery, mais plus grand et à tête bien plus large et plus courte.

**Pheidole termitobia** n. sp. — ♂. — Long. environ 2,6 mill. — voisine du groupe *flavens*. Mandibules luisantes avec des points épars et quelques stries à leur base. Épistome légèrement échancré au milieu de son bord antérieur et imprimé transversalement derrière, sans carène médiane, mais avec une petite carène oblique latérale de chaque côté. Aire frontale arrondie derrière. Tête plus élargie derrière, plus convexe au front et sur les côtés que chez la *flavens*. Les scapes, plus longs, atteignent au moins le tiers postérieur de la tête; leur extrémité est plus rapprochée de l'angle occipital que de l'œil. Le scrobe qui renferme les scapes est nettement délimité de tout côté jusqu'à leur extrémité postérieure et seulement réticulé-punctué au fond. Les arêtes frontales, divergentes, sont de même nettement prolongées jusqu'à l'extrémité postérieure du scrobe. Le pro-mésonotum est fortement convexe, avec les tubercules du pronotum moins proéminents que chez la *Ph. flavens*, et une incisure transversale étroite près de l'extrémité postérieure du mésonotum; un bourrelet transversal derrière l'incisure. Face déclive du métonotum plutôt plus longue que la face basale. Les épines sont larges à leur base et fort longues, aussi longues que la face basale et plus longues que leur intervalle. Premier article du pédicule plus longuement pétiolé que chez la *flavens*; deuxième nœud 1 1/2 fois plus large que long.