

Abdomen, dessus du deuxième article du pédicule, pattes, scapes et fond de l'épistome lisses et luisants avec quelques points épars très fins; le reste avec une ponctuation réticulaire foncière plus ou moins serrée qui le rend mat et subopaque, mais qui s'efface sur l'occiput. Front avec des stries ou rides longitudinales droites et régulières, ainsi que l'épistome où elles sont plus fines. Côtés de la tête grossièrement ridés en long et réticulés. Occiput grossièrement réticulé; les réticulations passent aux rides sur le vertex et les côtés. Thorax transversalement ridé dessus.

Pilosité dressée répandue partout, plutôt courte et assez oblique, passant à la pubescence sur les tibias et les scapes, surtout sur les tibias qui n'ont pas de poils dressés proprement dits (pubescence soulevée).

D'un roux ferrugineux. Mandibules, scapes, pattes et moitié antérieure de l'abdomen d'un jaune brunâtre. Derrière de l'abdomen et presque tout le funicule brunâtres.

♀. — Long. 1,4 à 1,6 mill. — Tête distinctement échancrée derrière, distinctement dépassée par les scapes. Épistome convexe, comme chez le ♂, mais mat et réticulé-ponctué. Pas de scrobe. Mésonotum convexe, sans sillon transversal. Les épines du métanotum sont aussi longues que leur intervalle, mais plus courtes que la face basale.

Tête, thorax et premier article du pédicule simplement réticulés-ponctués et mats, sans sculpture grossière par-dessus, sauf quelques rides sur le devant de la tête. Pilosité et couleur du ♂, mais la tête et le thorax sont d'un ferrugineux plus clair, plus jaunâtre.

♀. — Long. 3,3 à 3,5 mill. — Semblable au ♂. Scrobe aussi distinct. Épines aussi longues, mais leur intervalle est plus grand. Mésonotum strié en long avec le fond réticulé; scutellum en partie lisse et en partie rugueux; second nœud du pédicule réticulé-ponctué et mat; ponctuation piligère de l'abdomen plus distincte; du reste, sculpture du ♂. Pilosité plus abondante et un peu plus dressée que chez le ♂.

D'un roux brunâtre. Abdomen entièrement brun châtain. Quelques taches nuageuses brunes sur la tête et le thorax. Pattes, mandibules, devant de la tête et antennes d'un jaune brunâtre.

Sao Leopoldo, Rio Grande do Sul, récoltée par M. Heyer, chez les termites et reçue par M. Wasmann.

Une variété un peu plus petite et à épines plus courtes de l'ouvrière, de même provenance.

CREMASTOGASTER QUADRIFORMIS Roger. — M. Heyer a trouvé la forme typique de cette espèce à Sao Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brésil, vivant chez les termites.

Var. *gracilior* n. var. — ♀. — Diffère surtout par sa taille plus