

6. *STENAMMA* (MESSOR) *BARBARUM* r. *STRIATICEPS* André. — ♂. — Ouargla; Hamâda, entre Mellalah et Houderat; Settafa à Laghouat (Lameere). Le D^r Krauss l'a trouvé dans les mêmes localités. Je l'ai pris à Tebessa. C'est une race saharienne qui s'avance un peu dans l'Atlas.

7. *Stenamma* (Messor) *caviceps* n. sp. — ♂. — Long. 4 à 5,7 mill. — Mandibules de forme courte et arrondie, munies devant de 3 dents plus fortes et derrière de 8 à 9 denticules indistincts. Elles sont luisantes et régulièrement striées. Épistome et arêtes frontales comme chez le *S. barbarum*. La tête est aussi large que longue, même chez les ♀ minima, ou peu s'en faut, avec le bord postérieur convexe (même chez les ♀ maxima) et les côtés plus convexes que chez le *barbarum*. Elle est atténuée dans le sens dorso-ventral, avec la face inférieure très distinctement concave d'avant en arrière, subplane ou légèrement concave de droite à gauche, bordée d'une rangée de soies courbes, fauves, très longues et obliques au bord postérieur, d'où elles se dirigent en avant, se raccourcissant et s'éclaircissant en avant, sur les côtés, puis s'allongeant de nouveau sous les mandibules. Une rangée de cils analogues au bord antérieur de l'épistome. Les yeux sont fort grands et occupent une surface double environ de celle d'un *barbarum* de même taille. Les proportions des antennes sont comme chez le *barbarum*, mais le funicule est un peu plus grêle vers sa base. Thorax plus grêle et plus allongé que chez le *barbarum*; pronotum moins bossu, métanotum plus anguleux, mais inerme. Le nœud du premier article du pédicule est un peu plus comprimé (plus squamiforme), plus élevé, et l'abdomen plus atténué, plus étroit vers sa base. Les pattes sont un peu plus grêles.

Subopaque, finement réticulé. Joux et fossettes antennaires assez finement ridées. Métanotum fortement et transversalement ridé. Mésonotum et pronotum en partie et irrégulièrement ridés.

Sauf les soies et cils du dessous de la tête et du bord de l'épistome, l'insecte est presque glabre; quelques rares poils courts et fauves sur la tête, le devant du thorax et l'extrémité de l'abdomen. Les pattes et les scapes n'ont qu'une pubescence d'un jaune rousâtre, espacée, adjacente ou subadjacente et courte. Pubescence nulle sur le corps.

D'un brun noirâtre. Thorax d'un brun rougeâtre. Pattes, antennes, mandibules et devant des arêtes frontales d'un jaune brunâtre ou en partie d'un brun jaunâtre.

Du Souf, entre Tougourt et El Oued, au bordj de Maouiet-al-Caïd (Lameere).

Cette forme granivore saharienne est extrêmement curieuse.