

8. *STENAMMA* (*APHIÆNOGASTER*) *TESTACEO-PILOSUM* Lucas. — ♂. — Saint-Charles, près Philippeville (Lameere). Espèce méditerranéenne de l'Atlas, jamais saharienne.

9. *STENAMMA* (*APHIÆNOGASTER*) *SUBTERRANEUM* LATR., v. *SPLENDIDOIDES* Forel. — ♂ et ♀. — Saint-Charles, près Philippeville (Lameere). Forme de l'Atlas.

10. *HOLCOMYRMEX* *CHOBAUTI* Emery. — ♂. — Biskra, montagne de sable; Souf, de Tougourt à Maouiet-al-Caïd; Blidet-Amar à Tillis (Lameere). Espèce granivore, récoltée avec ses graines. M. Chobaut en avait récolté, en 1896, deux exemplaires à Biskra, les types d'Emery, seuls connus jusqu'ici. On voit qu'il s'agit d'une forme saharienne. Sa tête a en dessous la forme de celle du *Messor caviceps*, et la même barbe encore plus régulière sur les côtés. M. Lameere a observé ses mœurs moissonneuses.

11. *Holcomyrmex Lameerei* n. sp. — ♂. — Long. 4 mill. — Mandibules tridentées. A peine plus grand que le *Chobauti*, qui atteint parfois aussi 4 millimètres, mais plus robuste. Il en diffère comme suit. La tête est plus convexe, plus épaisse dans le sens dorso-ventral. Sa face inférieure est bien moins aplatie, même légèrement convexe sur les côtés (à peine un peu concave longitudinalement au milieu). Elle est revêtue d'une pilosité fine, beaucoup plus courte que chez le *Chobauti*, à peine courbée et plus irrégulière. L'épistome a une portion médiane plus fortement tronquée ou même imprimée (un peu concave) et plus bordée que chez le *Chobauti*; les deux carènes latérales formées par les bords latéraux de cette surface tronquée se terminent au bord antérieur par deux dents assez fortes (par des angles mousses chez le *Chobauti*). La tête est un peu plus large. Le mésonotum et le métanotum sont à la fois plus larges, plus robustes et moins descendants relativement au pronotum; le dos du thorax est donc plus uniforme, à peine abaissé en arrière, mais avec une échancrure méso-métanotale faible. Métanotum inerme. Le pédicule a la même forme; le premier nœud est un peu plus élevé et le second légèrement plus large. Les scapes sont bien plus courts que chez le *Chobauti* et fort loin d'atteindre le bord occipital.

Densément et très finement strié, avec un reflet soyeux. Les stries sont transversales sur le thorax et un peu plus grossières sur le métanotum. Sur la tête elles sont longitudinales au milieu et de côté, mais elles divergent à l'occiput où elles deviennent transversales. De l'œil à l'occiput, elles sont obliques et contournées, autour des fossettes antennaires arquées. Au fond, les stries sont un peu réticulaires. Pédicule strié-réticulé, lisse au sommet des nœuds.